

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZAN"

FACULTAD DE ENFERMERÍA



**"FACTORES MATERNOS RELACIONADOS AL PARTO
PRETÉRMINO EN EL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN
MEDRANO HUANUCO-ENERO A DICIEMBRE 2012"**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN ENFERMERÍA**

TESISTAS:

Bach. Enf. HUACACHINO MAIQUI, Miguel Angel

Bach. Enf. JARA CARHUA, José Luis

ASESORA:

MG. VELA LOPEZ, Silna Teresita

HUÁNUCO – PERÚ

2013

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores maternos relacionados al parto pretérmino en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano Huánuco-Enero a Diciembre 2012.

Diseño: Diseño descriptivo-no experimental relacional. Características de la

población y metodología: Se recolectó la información de 135 historias clínicas de

aquellas madres que tuvieron parto pretérmino en la Unidad de Admisión del Hospital Regional Hermilio Valdizán 2012. La relación entre las variables se

analizó mediante correlación Ji – Cuadrado X^2 empleando el paquete estadístico

SPSS versión 19. **Resultados:** Durante el año 2012 de enero a diciembre se

registró 78 (57,8%) partos pretérmino leve, de 19 a 35 años de edad 68 (50,4%),

secundaria 55 (40,7%), conviviente 96 (71,1%), ama de casa 60

(44,4%),residencia Urbano 73 (54,1%) sin periodo intergenésico 54 (40,0%),

control inadecuado 79 (58,5%), multíparas 74 (54,8%), tipo de parto vaginal 111

(82,2%),embarazo único 113 (83,7%), ningún aborto 108 (80,0%), con

antecedentes de parto pretérmino 30 (22,2%) ruptura prematura de membrana

106 (78,5%), anemia 45 (33,3%), infección del tracto urinario 105 (77,8%),

Preeclampsia-eclampsia 21 (15,6%) y hemorragias obstétricas 54 (40%). Se

encontró una correlación positiva. El análisis inferencial del **factor**

sociodemográfico Ji – Cuadrado $X^2 = 71,149$; g.l=6 $\alpha=0.95$ y un P valor (0,000),

Factores de riesgo obstétrico Ji – Cuadrado $X^2 = 76,624$; g.l=6 $\alpha=0.95$ y un P

valor (0,000), **Factores según complicaciones de la gestación**, Ji – Cuadrado

$X^2 = 60,827$; g.l=6 $\alpha=0.95$ y un P valor (0,000) asociándose al parto pretérmino.

Conclusión: Los factores socio demográfico; la edad de 19 a 35 años, secundaria, ama de casa, convivientes, residencia urbana; en el riesgo obstétrico resalta sin periodo intergenésico, control inadecuado y embarazo único. Según complicación de la gestación está la ruptura prematura de membranas e Infección del tracto urinario todos ellos como factores asociados a la presencia de un parto pretérmino.