UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"

FACULTAD DE OBSTETRICIA

INFLUENCIA DE LA PRIMIGRAVIDEZ EN LA PREECLAMPSIA EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECO – OBSTETRICIA HOSPITAL REGIONAL "HERMILIO VALDIZAN MEDRANO" DE HUANUCO OCTUBRE 2012- MAYO 2013

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: OBSTETRIZ

TESISTA: DIEGO LLANOS, Luz Sandy
OLORTIN VALENTIN, Angela Yanett

ASESOR: Mg. DIGNA MANRIQUE DE LARA SUÁREZ

HUÁNUCO – PERÚ
2013

RESUMEN

En el mundo, la preeclampsia complica alrededor de 10% de los embarazos de mujeres de los países en desarrollo, y una cifra ligeramente menor en los países industrializados. Cuando no se diagnostica oportunamente o no se atiende en forma apropiada, puede evolucionar hacia las formas más graves y a complicaciones, como el síndrome de HELLP y la eclampsia, lo que aumenta las probabilidades de morbilidad y mortalidad materna y perinatal.

El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de la primigravidez en la preeclampsia en gestantes atendidas en el servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrano" - Huánuco, de octubre de 2012 a mayo de 2013; investigación que incluye conocer su incidencia en primigrávidas, identificar los factores de riesgos asociados a esta patología, determinar el numero de atenciones pre natales y la vía de finalización de embarazo en gestantes primigrávidas.

El material y métodos se basaron un estudio de tipo retrospectivo, transversal, correlacional y descriptivo. Los datos para el estudio se obtuvieron de las historias clínicas de las gestantes hospitalizadas con diagnóstico de preeclampsia en el período establecido, las cuales fueron revisadas minuciosamente.

La población del presente estudio está conformada por 457 primigrávidas y la muestra por 65 primigrávidas preeclámpticas atendidas en el Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrano". Los resultados revisados comprenden desde octubre de 2012 a mayo de 2013.

Concluimos que la preeclampsia en primigrávidas presenta alta incidencia en el hospital donde se realizo el estudio y está asociada a factores de riesgo

biológicos, sociales y culturales: edades comprendidas entre 18 a 26 años (58,5%), grado de instrucción de nivel secundario(50,8%), estado civil conviviente(53,8%), de religión católica(73,8%), lugar de residencia urbano marginal (43,1%), más de 6 atenciones pre natales (44,6%), se presentó con mayor frecuencia a partir de las 37 semanas de gestación; y la vía de finalización del embarazo tienen diferencias minimas entre el parto vaginal y la cesárea.

Palabras Clave: Primigravidez, Preeclampsia.