

**UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"  
HUÁNUCO  
FACULTAD DE OBSTETRICIA**



---

**“FACTORES PREDISPONENTES DEL BAJO PESO AL  
NACER EN MADRES ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL  
TOCACHE II-1, 2009 - 2012”**

---

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  
OBSTETRA**

**TESISTA : LLANOS NACIÓN, MARÍA EUGENIA**

**ASESORA: Mg. DIGNA MANRIQUE DE LARA SUAREZ**

**HUÁNUCO – PERÚ**

**2013**

## RESUMEN

**Objetivo:** Identificar los Factores predisponentes del bajo peso al nacer en madres adolescentes en el Hospital de Tocache II-1, 2009-2012.

**Metodología:** El presente estudio según el paradigma de investigación es cuantitativo. Según el método de investigación el estudio es no experimental, ya que se observó los fenómenos tal y como ocurren. Según el período y secuencia de los hechos y registro de la información el estudio es de tipo transversal por qué se estudió las variables en un determinado momento del período de investigación.

Según al tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información el estudio será de tipo retrospectivo.

La investigación es deductivo e Inductivo; en donde se analizó los resultados de la ficha de recolección de datos del análisis documental de las usuarias que fueron hospitalizadas; respecto a los factores predisponentes del bajo peso al nacer en madres adolescentes en el Hospital de Tocache II-1, 2009-2012. Con el propósito de establecer conclusiones y generalizar los resultados de la investigación.

**Resultados :** Dentro de los factores predisponentes para el bajo peso al nacer en madres adolescentes en el Hospital Tocache II-1 se encuentra con mayor frecuencia el nivel socioeconómico bajo con 167 (65%) y la ganancia de peso materno bajo con 108 (42%).

**Conclusiones:** Existen factores sociales y biológicos principales que conllevan al bajo peso al nacer en las pacientes que se hospitalizaron en el Hospital Tocache II-1 siendo los factores sociales que actúan sobre los factores biológicos es así que la ganancia de peso materno bajo, con 108 (42%) es el efecto principal del factor nivel socioeconómico bajo ,con 167 (65%). Se encontró que de las 257 madres adolescentes del Hospital Tocache II-1 sólo 79 (30.7%), tuvieron más de 6 CPN y la tasa más alta es de 1-3 CPN 88 (34.2%), lo que nos indica que los CPN se encuentran deficiente.

**Palabras claves:** Adolescente, Bajo peso al nacer, embarazo adolescente, factor de riesgo, nivel socioeconómico, nutrición materna, atención prenatal.