UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA

CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA

CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL CANINA CON RIESGO ZOONÓTICO EN PERSONAS ADULTAS QUE ASISTEN A UNA CLÍNICA VETERINARIA DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA 2021

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE MÉDICO VETERINARIO

TESISTA

Camilo André Romero Leiva

ASESOR:

Dr. Miguel Angel Chuquiyauri Talenas

HUÁNUCO – PERÚ

2022

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA

CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA

CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL CANINA CON RIESGO ZOONÓTICO EN PERSONAS ADULTAS QUE ASISTEN A UNA CLÍNICA VETERINARIA DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA 2021

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE MÉDICO VETERINARIO

TESISTA

Camilo André Romero Leiva

ASESOR:

Dr. Miguel Angel Chuquiyauri Talenas

HUÁNUCO – PERÚ

2022

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de Investigación a las personas que siempre han confiado en mí y me han brindado todo su apoyo a pesar de todas las adversidades que se puedan presentar.

Muchas gracias tía, hermanos, amigos, profesores y sobre todo a mamá.

AGRADECIMIENTOS

Especialmente al Dr. Luciano Casas, por su tiempo, disposición y enseñanzas sobre distintos temas, no solo sobre mi trabajo de investigación. Además agradezco a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y a los maestros por guiarme en los pasos necesarios para la realización de mi tesis.

Muchas gracias.

RESUMEN

El trabajo de Investigación tuvo como objetivo determinar el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. Se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal y descriptivo aplicando una encuesta con preguntas cerradas, encuestando a 395 personas adultas entre 18 a 60 años, durante los meses de junio a agosto del 2021. Los resultados fueron que el 86,6% (N=342) de personas adultas conoce sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico, mientras que el 13,4% (N=53) no tienen conocimiento, siendo los varones (87,3%) con mayor conocimiento frente a las mujeres (86,1%) pero no habiendo relación según el sexo (p=0,732), del mismo modo las personas adultas entre 30 a 60 años (88%) tienen mayor conocimiento frente a los jóvenes adultos entre 18 a 29 años (85,7%) pero no habiendo relación según el edad (p=0,507). En conclusión la mayoría de las personas adultas tiene conocimiento sobre la prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico, no habiendo relación con el sexo y la edad.

Palabras clave: Prevención, Parasitosis intestinal, Canina, Zoonótico.

SUMMARY

The objective of the research work was to determine the knowledge about the prevention of canine intestinal parasitosis with zoonotic risk in adults who attend a private Veterinary Clinic in the district of Magdalena del Mar-Lima 2021. An observational, prospective, cross-sectional and descriptive study was carried out. applying a survey with closed questions, surveying 395 adults between 18 and 60 years old, during the months of June to August 2021. The results were that 86.6% (N=342) of adults know about parasitosis prevention intestinal canine with zoonotic risk, while 13.4% (N = 53) have no knowledge, being men (87.3%) with greater knowledge compared to women (86.1%) but there is no relationship according to the sex (p=0.732), in the same way adults between 30 and 60 years old (88%) have greater knowledge compared to young adults between 18 and 29 years old (85.7%) but there is no relationship according to age (p =0, 507). In conclusion, most adults are aware of the prevention of canine intestinal parasitosis with zoonotic risk, and there is no relationship with sex and age.

Keywords: Prevention, Intestinal parasites, Canine, Zoonotic.

.

INTRODUCCIÓN

La investigación se realizó por el interés de determinar el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico. Esto permitirá incentivar la desparasitación, el lavado de manos, el uso de zapatos, como medios preventivos para evitar enfermedades parasitarias en el hombre.

Por otra parte se determinó la relación del conocimiento según sexo, así como también según rango de edad, en propietarios que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar, Lima.

La investigación se realizó con una serie de preguntas en base a un cuestionario virtual a personas adultas. Uno de los obstáculos fue el tiempo que se requiere para poder responder todas las preguntas. Si bien la mayoría de personas adultas del distrito de Magdalena cuentan con Internet, no todos tienen afinidad por llenar un cuestionario virtual, otros prefieren realizarlo de forma manual.

El objetivo del presente trabajo es determinar el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

En el capítulo I se realizó el planteamiento ¿Cuál es el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021?.

En el capítulo ll se mencionó los antecedentes internacionales, nacionales y regionales, además hablaremos sobre Salud Pública, parásito, parasitosis y las medidas de prevención. A su vez mencionaremos los parásitos intestinales caninos

con riesgo zoonótico más comunes que afectan al hombre, vías de transmisión y manifestaciones clínicas.

En el capítulo lll de describió el marco metodológico, todo lo referente al tipo, nivel y diseño de la Investigación. Asimismo, se mencionará la población, muestra de estudio, se informará las técnicas de recolección, procesamiento y análisis de datos.

En el capítulo IV se observó el tratamiento estadístico, utilizando cuadros, tablas y gráficos. Además conclusiones, sugerencias, discusión, bibliografía y anexos.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS.....IV

DEDICATORIA.....**V**

RESUMEN.....VI

SUMMARY.....VII

INTRODUCCIÓN.....VIII

ÍNDICE.....X

ÍNDICE DE TABLAS.....XIII

ÍNDICE DE FIGURAS.....XIV

PROBLEMA DE INVESTIGACION.....15

1.1 Descripción del Problema.....15

1.2. Formulación del problema.....16

1.2.1. Formulación del Problema general.....16

1.2.2. Problemas específicos.....16

1.3. Objetivos.....17

1.3.1. Objetivo general.....17

1.3.2. Objetivos específicos.....17

1.4. Hipótesis.....18

1.4.1. Hipótesis General.....18

1.4.2. Hipótesis Específicas.....18

1.5. Variables.....19

1.5.1. Variable Independiente.....19

1.5.2. Variable Dependiente.....19

1.6. Justificación e importancia 19

1.7. Viabilidad 19

1.8. Limitaciones 20

MARCO TEÓRICO 21

2.1. Antecedentes 21

2.1.1. Antecedentes Internacionales 21

2.1.2. Antecedentes Nacionales 22

2.1.3. Antecedente Regional 23

2.2. Bases Teóricas *25*

2.2.1. Salud Pública 25

2.2.2. Párasito 25

2.2.3. Parasitosis 25

2.2.4. Parasitosis intestinal 26

2.2.5. Prevención 26

2.2.5.1. Prevención de parasitosis intestinal canina 26

2.2.6. Importancia en salud pública *27*

2.2.7. Susceptibilidad 27

2.2.8. Parasitosis inestinal canina en el hombre 28

2.3. Definición de términos conceptuales 32

MARCO METODOLÓGICO 34

3.1. Tipo de Investigación 34

3.1.1 Nivel de Investigación 34

3.1.2. Diseño de la Investigación 34

3.2. Población y muestra 34

3.3. Técnicas de recojo de datos 36

3.4. Instrumentos de recolección de datos y validación del instrumento 37

3.4.1. Procesamiento de datos 37

3.4.2. Análisis de datos 37

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 38

CONCLUSIONES 57

SUGERENCIAS 63

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 64

NOTA BIBLIOGRÁFICA 72

MATRÍZ DE CONSISTENCIA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 74

EVALUACIÓN DE EXPERTO 77

CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL CANINA CON RIESGO ZOONÓTICO EN PERSONAS ADULTAS QUE ASISTEN A UNA CLÍNICA VETERINARIA DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA 2021 79

BASE DE DATOS 86

CATEGORIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL CANINA CON RIESGO ZOONÓTICO EN PERSONAS ADULTAS QUE ASISTEN A UNA CLÍNICA VETERINARIA DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA 2021 92

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Edad de la personas adultas encuestadas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021…….....38

Tabla 2 Sexo de las personas adultas encuestadas que asisten a una Clínica Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021……..39

Tabla 3 Definición del término parásito…….....40

Tabla 4¿Qué es la parasitosis intestinal?.....41

Tabla 5 Los parásitos pueden encontrarse……...42

Tabla 6 Edad más susceptible a los parásitos...……43

Tabla 7 Afecciones a las personas con parásitos……..44

Tabla 8 Respecto a los parásitos……45

Tabla 9¿Cómo se daría cuenta si un niño tiene parásitos?.....46

Tabla 10¿Qué signos y/o síntomas presenta una persona con parásitos?.....47

Tabla 11 Respecto a la parasitosis. Es considerado un riesgo para el humano…..…48

Tabla 12 Si una persona tiene parásitos y cuenta con mascota. Lo correcto es…….49

Tabla 13 Respecto al lavado de manos, lo correcto es que se realice……..50

Tabla 14¿Cómo podemos prevenir la parasitosis en el humano?.....51

Tabla 15 Respecto al uso de zapatos……..52

Tabla 16¿Por qué es importante conocer sobre los parásitos?.....53

Tabla 17¿Cuál es la medida más eficiente que se debe tomar con las mascotas al sacarlas a pasear para evitar la transmisión de parásitos al humano?.....54

Tabla 18 Controlando las pulgas se pueden prevenir parásitos intestinales……..55

Tabla 19 Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021……..……...*56*

Tabla 20 Relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021..……..*57*

Tabla 21 *Relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021*...…….....*59*

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Edad de la personas adultas encuestadas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021…….....37

Figura 2 Sexo de las personas adultas encuestadas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021…….....39

Figura 3 Definición del término parásito parásito……...40

Figura 4¿Qué es la parasitosis intestinal?.....41

Figura 5 Los parásitos pueden encontrarse……...42

Figura 6 Edad más susceptible a los parásitos……...43

Figura 7 Afecciones a las personas con parásitos……..44

Figura 8 Respecto a los parásitos……....45

Figura 9 ¿Cómo se daría cuenta si un niño tiene parásitos?.....46

Figura 10 ¿Qué signos y/o síntomas presenta una persona con parásitos?.....47

Figura 11 Respecto a la parasitosis. Es considerado un riesgo para el humano……..48

Figura 12 Si una persona tiene parásitos y cuenta con mascota. Lo correcto es……..49

Figura 13 Respecto al lavado de manos, lo correcto es que se realice……...50

Figura 14 ¿Cómo podemos prevenir la parasitosis en el humano?.....51

Figura 15 Respecto al uso de zapatos……52

Figura 16¿Por qué es importante conocer sobre los parásitos?.....53

Figura 17 ¿Cuál es la medida más eficiente que se debe tomar con las mascotas al sacarlas a pasear para evitar la transmisión de parásitos al humano?.....54

Figura 18 Controlando las pulgas se pueden prevenir parásitos intestinales……55

Figura 19 *Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021*…….....*56*

Figura 20 *Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021*……..…….……*58*

Figura 21 *Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021*…….....*60*

CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1 Descripción del Problema

La Salud Pública es la ciencia y arte que mejora la salud de las personas, previniendo enfermedades, además de promover salud física, mental y así prolongar la vida del ser humano. Una de las formas es mediante la higiene personal, disminuyendo los riesgos de contagio en la población y dentro de una de sus prioridades se encuentra disminuir las desigualdad de la salud **(Calderón *et al*, 2021).**

Se denomina parásito, a un organismo que depende de otro ser, llamado huésped, crece, se alimenta, obtiene protección y nutrientes. El parásito no aporta ningún bien al huésped y puede llegar a convertirse en patógeno produciendo enfermedad en el hombre, afectando su calidad de vida **(Sánchez *et al*, 2017).**

La parasitosis intestinal es una problemática que afecta al mundo, siendo el hombre, el que se encuentra en contacto estrecho con el perro. **(Martínez *et al,* 2010)**. Si una persona no cuenta con mascota, puede tener contacto con el cachorro de su vecino o con heces de un animal, produciendo enfermedades parasitarias **(Coniel *et al*, 2012).** Los parásitos afectan en mayor medida a los países en crecimiento, ya que carecen de cultura y educación sanitaria. **(Del Barco *et al*, 2009).**

La muertes por enfermedades parasitarias son bajas, sin embargo la morbilidad es alta, afectando la calidad de vida de las personas, ocasionando en los niños un retraso en su desarrollo, mala absorción a nivel intestinal y pérdida de peso **(Martínez *et al*,**

2010). Sin embargo muchas personas son asintomáticas al inicio de la enfermedad, debido que tienen un sistema inmunológico óptimo y una baja carga de estos organismos **(Gutiérrez *et al*, 2007).**

La prevención es un conjunto de medidas que se realizan no solo con el fin de evitar enfermedades, sino también frenar el avance y disminuir el impacto que puede generar en la población, mejorando la calidad de vida de las personas a corto, mediano o largo plazo. Con el fin de evitar el contagio de parásitos intestinales caninos con riesgo zoonótico, se debe de tomar medidas preventivas, como lavado de manos antes y después de tocar al animal, eliminación adecuada de heces, desparasitación, lavado de ropa, limpieza del hogar, adecuado saneamiento ambiental, entre otros **(Cando, 2016).**

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Formulación del Problema general

- ¿Cuál es el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021?.

1.2.2. Problemas específicos

- ¿Cuál será la relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021?.
- ¿Cuál será la relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de

edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021?.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

- Determinar el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

1.3.2. Objetivos específicos

- Determinar la relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

- Determinar la relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

1.4. Hipótesis

1.4.1. Hipótesis General

- **Ho:** No existe conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.
- **Ha:** Sí existe conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

1.4.2. Hipótesis Específicas

- **Ho_1**: No existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.
- **Ha_1:** Sí existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.
- **Ho_2**: No existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.
- **Ha_2:** Sí existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

1.5. Variables

1.5.1. Variable Independiente

- Personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria.

1.5.2. Variable Dependiente

- Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico.

1.6. Justificación e importancia

En Lima existe una pobre educación sanitaria y una falta de medidas de control y prevención de parásitos, ya sea por el poco conocimiento, interés o tradiciones de cada localidad. Es el hombre, el que se encuentra en contacto estrecho con la mascota, siendo un riesgo, ya que podría contraer enfermedades parasitarias. Estos microorganismos son un problema de salud pública a nivel mundial y son los niños los más afectados, ya que no tienen una correcta higiene y acuden a parques o zonas contaminadas. Conllevando a una deficiencia en el aprendizaje, además de afectar su desarrollo.

1.7. Viabilidad

El trabajo de Investigación fue viable, ya que el investigador contó con el tiempo disponible y el interés sobre el tema de investigación. Además se obtuvo información relacionado al tema y el financiamiento necesario para este estudio.

1.8. Limitaciones

En cuanto a limitación interna, el realizar un cuestionario virtual puede no ser tan interesante para la personas, ya que están expuestas a un sinfín de contenido en la red. Además se requiere tiempo para responder todas las preguntas. Si bien la mayoría de las personas del distrito de Magdalena cuentan con Internet, no todos tienen afinidad por llenar un cuestionario virtual, otros prefieren realizarlo de forma manual. Una limitación externa es la coyuntura a nivel mundial, ya que no se podrá realizar el cuestionario de manera presencial.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

2.1.1. Antecedentes Internacionales

Kassaw *et al*. (2020). "Attitude and Practice of Mothers on Prevention and Control of Intestinal Parasitic Infestations in Sekota Town, Waghimra Zone, Ethiopia". Se concluyó que el 45,2% (171/378) de las madres, conoce sobre la prevención y el control de los parásitos intestinales y el 54,8% (207/378) no conoce sobre ello.

Esparza (2019). "Conocimientos sobre prevención de parasitosis intestinal en madres con niños menores de 5 años del Barrio Nuevo Amanecer de la ciudad de Loja". Concluyéndose que el 78% (54/69) conoce que las heces de las mascotas se deben de desechar adecuadamente en el tacho de basura. Solo el 18% (12/69) conoce el significado de parasitosis intestinal.

Peralta *et al.* (2019). "Conocimientos, actitudes y prácticas acerca de Parasitosis intestinal en adultos que asistieron a Consulta de atención primaria en la comunidad de Paya Municipio Baní, provincia Peravia, República Dominicana durante el periodo mayo-junio 2018". Se concluyó que el 33% (89/270) de las personas conocen lo que es un parásito. Un 3% (10/302) de las respuestas, afirma que se adquieren por no lavarse las manos y un 9 % (26/302) por estar descalzo.

Alvarado (2011). “Nivel de conocimiento sobre parasitosis, de los padres de familia de los alumnos de la “Escuela Vicente Bastidas R” del barrio Clodoveo Jaramillo, de la ciudad de Loja, y su influencia en el rendimiento académico, durante el periodo marzo-agosto 2011”. Universidad Nacional de Loja. Loja. Se concluyó que el 28% (14/50) de padres de familia conocen sobre parasitosis intestinal, un 30% (15/50) no conoce y con un 42% (21/50) conoce a nivel medio.

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Flores y Seminario (2020). “Conocimientos, actitudes y prácticas de las madres para prevenir parasitosis intestinal en niños preescolares. Caserío Cruz del Médano, Mórrope-2018”. Se concluyó que el 15% (53/346) conoce sobre medidas preventivas de parasitosis intestinal, el 18% (61/346) no conoce y un 67% (231/346), tuvo un conocimiento regular. Solo una madre tuvo conocimiento muy bueno.

Romani y Quispe (2019). “Conocimiento sobre parasitosis intestinal en madres con niños de 2 a 5 años. Centro de Salud Santiago–Ica, 2019”. Se concluyó que 41,9%(39/93) de las madres no conoce sobre las medidas de prevención de parasitosis intestinal. El 39,8%(37/93) tiene conocimiento regular y el 18,3% (17/93) conoce del tema.

Peña (2016). “Conocimiento y Prácticas en la prevención de parasitosis intestinal por las madres que acuden al Centro de Salud Carlos Showing Ferrari, Amarilis-Huánuco 2015". Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Huánuco. 2015”. Se llegó a la conclusión que el 36,3% (28/77) de madres conoce sobre la prevención de parasitosis intestinal. El 54,6% (42/77) tienen conocimiento regular y el 9,1%(7/77) no conoce sobre el tema.

2.1.3. Antecedente Regional

Paucar (2021). “Conocimientos sobre parasitosis intestinal en madres de niños de 3 a 5 años de una Institución Educativa Inicial de Lima Este”. Se concluyó que el 60% (43/72) no conoce sobre medidas de prevención de parasitosis intestinal y un 40%(29/72) conoce.

Changa (2018). “Asociación entre el nivel de conocimiento sobre parasitosis intestinal y sus medidas preventivas de madres de niños entre las edades de 5 a 12 años que acuden al Hospital de Vitarte durante el año 2017”. Se concluyó que el 54,4% (173/318) conoce sobre las medidas preventivas de parasitosis intestinal.

León *et al*. (2017). "Nivel de conocimiento sobre parasitosis intestinal en padres de niños de 2 a 5 años que acuden al servicio de laboratorio clínico del Centro de Salud "Ex Fundo Naranjal",San Martín de Porres 2015". Se concluyó que el 97% (90/100) de padres conoce sobre medidas de prevención parasitosis intestinal.

Tuesta (2016). "Conocimiento de las madres sobre parasitosis intestinal en niños de 6 meses a 2 años que acudieron al control de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Palo de Acero - Huánuco – 2015". Se llegó a la conclusión que el 70% (21/30) conoce sobre medidas de prevención de parasitosis intestinal y un 30% (09/30) no conoce.

Sanchez *et al*. (2013)." Nivel de conocimiento sobre las medidas de prevención de parasitosis por las madres que acuden al Puesto de Salud "Las Flores", Santiago de Surco, Lima". Se concluyó que hubo una Igualdad entre las madres de familia que no conocen del tema 50% (50/100) y las que conocen, también con un 50% (50/100). Además, las madres con adultez mayor (más de 60 años), conocen del tema, 60% (3/5) y la juventud plena (20 a 24 años), no conoce, con 25%(9/12).

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Salud Pública

Ciencia y arte que mejora la salud de las personas, previniendo enfermedades, además de promover salud física, mental y así prolongar la vida del ser humano. Está regido no solo por Estado sino también por el sector privado, la sociedad y el mismo indivduo. Una de las formas es mediante la higiene personal, disminuyendo los riesgos de contagio en la población y dentro de una de sus prioridades se encuentra disminuir las desigualdad de la salud **(Calderón *et al*, 2021).**

2.2.2. Parásito

Organismo que vive a expensas de otro ser, llamado huésped, crece, se alimenta, obtiene protección y nutrientes. El parásito no aporta ningún bien al huésped y puede llegar a convertirse en patógeno produciendo enfermedad en el hombre, afectando su calidad de vida **(Sanchez *et al*, 2017).**

2.2.3. Parasitosis

Es la enfermedad infecciosa producida por la ingesta de parásitos. Resaltar que existe también, una vía de transmisión por la piel, afectando la calidad de vida del hombre **(Fumadó, 2015).**

2.2.4. Parasitosis intestinal

Es la enfermedad causada por parásitos que se localizan en el intestino, estos organismos son considerados infecciosos y de riesgo para la salud pública **(Rodriguez, 2014).**

2.2.5. Prevención

Conjunto de medidas que evitan la aparición de enfermedades, además de frenar el avance y disminuir el impacto que puede generar en la población, mejorando la calidad de vida las personas a corto, mediano o largo plazo **(Cando, 2016).**

2.2.4.1. Prevención de parasitosis intestinal canina

Con el fin de evitar el contagio de parásitos intestinales, se debe de impedir el ciclo biológico, evitando el riesgo de contraer enfermedades zoonóticas. Por ese motivo se debe de tomar medidas preventivas:

a) Lavado de manos antes y después de tocar a la mascota.

b) Eliminación adecuada de las heces de los animales.

c) Desparasitación correcta de las mascotas y del ser humano.

d) Lavado de ropa.

e) Limpieza del hogar.

f) Adecuado saneamiento ambiental.

g) Aplicación de antipulgas al día en la mascota.

h) Uso adecuado de calzado **(Cando, 2016) (Peña, 2016).**

2.2.6. Importancia en salud pública

La estrecha relación del hombre con el animal, predispone a una serie de enfermedades zoonóticas parasitarias, afectando principalmente a los niños, ya que no cuentan con una buena higiene. El calentamiento global tiene un rol importante en la infección al ser humano, ya que altera las características físicas del suelo, siendo una vía de infección importante **(Chacín, 2013).**

2.2.7. Susceptibilidad

Los niños son los más susceptibles, debido a que no cuentan con un sistema inmunológico desarrollado, además de no tener una correcta higiene y acudir a parques o zonas contaminadas con parásitos patógenos. Ocasionando retraso en el desarrollo mental, físico y repercutiendo en su desempeño escolar y en la economía del país **(Iannacone, *et al* 2006)**

2.2.8. Parasitosis intestinal canina en el hombre

Los parásitos que infectan al intestino del hombre son los protozoos y los helmintos que incluyen a los nemátodos, céstodos y tremátodos. En la actualidad son un problema a nivel mundial, principalmente en los países que no cuentan con servicios básicos sanitarios, una educación óptima y una cultura higiénica. El grado de la enfermedad no solo depende del patógeno, sino también del estado en el que se encuentra el hospedador **(Martinez, *et al* 2010) (Peña, 2016).**

Los parásitos intestinales que afectan con mayor frecuencia a los perros y son de carácter zoonóticos son : *Dypilidium caninum*, *Toxocara canis* y *Ancylostoma* spp. **(Naupay, *et al* 2019).**

2.2.9. Nematodos

Son los parásitos más abundantes en el mundo. Su morfología externa tiene apariencia de gusanos, delgados, cilíndricos, alargados y no segmentados. Catalogados de importancia en salud pública ya que son encontrados con mayor frecuencia en el hombre **(Thomas, *et al* 2017) (Saari, *et al* 2019) (Schlossber, 2013).** Se localizan en diversos hábitats como agua dulce, agua salada, suelo, plantas y animales, en climas calurosos y fríos. Se alimentan de bacterias, hongos, algas, levaduras, inclusive de otros nematodos. Su longitud es variable desde 82 micras hasta los 9 metros (parásito de la ballena). La infección del ser vivo se produce por la ingestión accidental de la fase larvaria infectiva (L3) **(Weaver, *et al* 1994) (Neira, *et al* 2008).**

2.2.9.1. *Toxocara canis*

Considerado de suma importancia en salud pública ya que afecta al ser humano produciendo ceguera, potencialmente curable y prevenible si se detecta a tiempo. La enfermedad que ocasiona es la llamada Toxocariosis. En el hombre este parásito no llega al estadío adulto, pueden pasar meses, incluso años causando reacción local inflamatoria, hemorragias, granulomas y necrosis en diversos órganos como cerebro, hígado, ojos y pulmones **(Huapaya, *et al* 2009).**

A) Formas de transmisión

El hombre es considerado hospedero accidental, se contagia al ingerir huevos fértiles larvados del perro (L3) o al consumir carne poco cocida de hospederos paraténicos infectados como el conejo. Los caninos pueden contraer este parásito, al momento de ingerir agua, pastos contaminados o en el acicalamiento, eliminando huevos por el excremento al medio ambiente, eclosionando al estadío larvario hasta mudar a la fase infectiva. **(Roldan, *et al* 2010).**

B) Manifestaciones clínicas

El humano puede cursar en el inicio de la enfermedad con síntomas inespecíficos como fiebre, malestar general, broncoespasmo. Con el pasar de los días manifiesta dolor abdominal, prurito, urticaria y vasculitis. También disnea, tos, llegando a la neumonía y efusión pleural. Muchas veces el paciente solo llega a la consulta quejándose de la disminución de su vista **(Huapaya, *et al* 2009).**

2.2.9.2. *Ancylostoma* spp.

Ancylostoma spp. también es de suma importancia en salud pública ya que genera una parasitosis en el hombre llamada larva migrans cutánea, caracterizada por una erupción en la piel en forma lineal y de serpiente, acompañada de intenso prurito y enrojecimiento, afectando los pies, las nalgas y los muslos. Considerada una enfermedad autolimitada, ya que no llega a ser adulto y termina muriendo de uno a seis meses aproximadamente **(Castro, *et al* 2002).**

A) Formas de transmisión

El hombre se contagia por la ingesta accidental de la larva infectante (L3) con materia fecal del perro o al tener contacto directo con el parásito, por ejemplo descalzo. El canino es el que elimina los huevos larvados por el excremento al medio ambiente, eclosionando al estadío infectivo **(Strube y Mehlhorn, 2021).**

B) Manifestaciones Clínicas

El hombre presenta una lesión enrojecida con vesículas o protuberancias en la piel llamadas papúlas, acompañada de picazón, además se visualiza una erupción en la piel en forma de serpiente. Existen reportes en los que puede llegar a generar cuadros gastroentéricos, además de neumonía y pérdida de la visión **(Plascencia, *et al* 2013) (Choc, 2018).**

2.2.9.3. Cestodos

Son parásitos planos, hermafroditas, segmentados y alargados. Constan de una cabeza, llamada escólex, cuello y cuerpo o estróbilo**,** constituido por un cadena de segmentos, denominados proglótides. Su ciclo biológico es complejo y no poseen tubo digestivo, careciendo de boca e intestino, alimentándose por un tegumento especializado **(Peña, 2016).**

A) *Dipylidium caninum*

Cestodo, habitante normal del intestino en los perros, gatos ,considerados hospederos definitivos. La pulga del perro (*Ctenocephalides canis*), gato (*Ctenocephalides felis*), del hombre (*Pulex irritans*) y del piojo del perro (*Trichodectes canis*), son llamados hospederos intermediarios y la persona (hospedero accidental) se infecta al consumir la larva cisticercoide, *Cryptocystis trichodectes*, ocasionando la enfermedad Dipilidiasis **(Ayala*, et al* 2012).**

B) Formas de transmisión

Los proglótides grávidos son expulsados por las excretas, en su interior contienen huevos, son ingeridos por los hospederos intermediarios donde se transforman en cisticercoide, el perro o el gato ingiere esta fase y se convierte en estadío adulto en el intestino. Es común encontrar los proglótidos en forma de arrocillo a nivel perianal de las mascotas. El humano se infecta al igual que las mascotas por el contacto estrecho que tienen con ellos, siendo los niños los más afectados **(Martínez, *et al* 2014).**

C) Manifestaciones Clínicas

Los más afectados son los niños y cursan con síntomas inespecíficos como diarrea, nauseas, dolor abdominal, picor anal, distensión del abdomen, gases, disminución de peso, pérdida de apetito, pudiendo llegar a un problema alérgico **(Neira, *et al* 2008).**

2.3. Definición de términos conceptuales

Broncoespasmo: contracción del músculo a nivel bronquial **(Nidia, 2014)**

Disnea: Dificultad para respirar **(Valdivieso y Valenzuela, 2015)**

Efusión pleural: acumulación de líquido entre los pulmones y la pared torácica **(Toro, 2009)**

Granuloma: inflamación compuesta por células(histiocitos, epitelioides y gigantes multinucleadas), en respuesta a un agente extraño **(Mohan, *et al* 2006).**

Hospedero accidental: individuo que no es imprescindible para permitir que siga existiendo el parásito en la naturaleza **(Elisa, 2020).**

Hospedero intermediario: huésped vertebrado o invertebrado, esencial para el ciclo de vida, el parásito no llega a la madurez sexual, pero alberga larvas y se multiplican asexualmente **(Pardo, 2005)**

Hospedero paraténico: individuo que sirve de alberge, el parásito no evoluciona y no es fundamental para su ciclo vital **(Elisa, 2020).**

Urticaria: es una reacción de la piel y se caracteriza por presentar edema y ronchas con prurito **(Méndez, *et al* 2018)**

Vasculitis: inflamación de los vasos sanguíneos que produce la disminución del riego sanguíneo a los tejidos **(Zoilo, 2012)**

Zoonosis: enfermedades infecciosas que se transmiten de manera natural de los animales vertebrados al hombre. **(Dabanchi, 2003)**

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación

La investigación es de tipo observacional, descriptivo y prospectivo. Debido a que se determinó el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. La variable de estudio no se manipuló y es de corte transversal, ya que es un estudio de hechos reales en un tiempo determinado. Considerado prospectivo, porque se realizó el trabajo después de su planeación.

3.1.1 Nivel de Investigación

El presente nivel de Investigación es descriptivo, porque se describió las variables según el momento de la observación.

3.1.2. Diseño de la Investigación

El diseño de investigación es no experimental.

3.2. Población y muestra

Población

La población objeto de estudio estuvo representada por personas mayores de 18 hasta 60 años que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar; la cantidad de propietarios de canes que acuden a la Veterinaria anualmente es de 20 000 personas.

Muestra

El tamaño de la muestra fue de 377 personas, el cual se obtuvo con la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N.Z^2.p.q}{(N-1).E^2+Z^2.p.q}$$

n: tamaño de la muestra.

N: tamaño de la población.

Z: nivel de confianza.

P: probabilidad positiva.

Q: probabilidad negativa.

E: error de estimación.

$$n = \frac{20\,000.\,(1.96)^2.(0.5).(0.5)}{(20\,000-1).(0.05)^2+(1.96)^2.(0.5).(0.5)}$$

n= 377 personas

El muestreo fue de tipo aleatorio simple

Para mayor realce se encuestó a 395 personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar, Lima. Adultos mayores de 18 hasta 60 años. Repartidos en dos rangos de 18-29 años y adultos de 30-60 años **(INEI, 2016).**

Criterios de inclusión

- Personas adultas de 18 hasta 60 años que viven en el distrito de Magdalena del Mar.
- Propietarios de canes que asisten a la Clínica Veterinaria.
- Personas de ambos sexos.

Criterios de exclusión

- Personas menores de 18 años y mayores de 60 años.
- Personas adultas que no viven en el distrito de Magdalena del Mar.
- Propietarios de canes que no asisten a la Clínica Veterinaria.

3.3. Técnicas de recojo de datos

La técnica que se utilizó fue la encuesta, la cual permite saber el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. Se envió el cuestionario por el Sistema dicha Veterinaria a todos los propietarios de canes.

3.4. Instrumentos de recolección de datos y validación del instrumento

El instrumento utilizado fue un cuestionario modificado **(Tuesta, 2016)**, consta de presentación, instrucciones, datos generales como edad, sexo; sometido al juicio de un experto, conformado por un profesional en el área (Anexo 2). El instrumento contiene 16 preguntas con alternativas de solo una respuesta correcta para cada pregunta (Anexo 3).

La validación del instrumento fue sometido al juicio de un experto en el tema, el cual es un profesional Médico Veterinario que labora en el Hospital Escuela de la Universidad Nacional de la Plata-Argentina.

3.4.1. Procesamiento de datos

Los datos recolectados fueron codificados y analizados en una tabla matriz del programa Microsoft Excel (Anexo 4) mediante tablas de frecuencias y porcentajes representados en gráficos de barras, procesados con el paquete estadístico SPSS. Ver. 25.0.

3.4.2. Análisis de datos

Para el análisis de los datos como la estadística no paramétrica para la relación de los grupos, se realizó mediante el estadístico Chi cuadrado (X^2) donde se construyó tablas y gráficos para la objetividad de la información, procesados con el paquete estadístico SPSS. Ver. 25.0.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Procesamiento y presentación de datos

4.1.1. Presentación de la Muestra

Tabla 1

Edad de las personas adultas encuestadas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

Edad	Frecuencia	Porcentaje
Jóvenes adultos (18-29 años)	237	60,0
Adultos (30-60 años)	158	40,0
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio

Figura 1

Edad de la personas adultas encuestadas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.



Fuente: Encuesta de estudio

En la tabla 1 y figura 1 se observa que del total de las personas adultas encuestadas (N=395), el 60% (237/395) están entre 18-29 años, y el 40% (158/395) están entre 30-60 años.

Tabla 2

Sexo de las personas adultas encuestadas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

	Frecuencia	Porcentaje
Mujer	245	62,0
Varón	150	38,0
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio

Figura 2

Sexo de las personas adultas encuestadas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.



Fuente: Encuesta de estudio.

Como se observa en la tabla 2 y figura 2, de las 395 personas adultas encuestadas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar, el 62%(245/395) fueron mujeres y el 38%(150/395) fueron varones.

4.1.2. Análisis descriptivo

Tabla 3

Definición del término parásito.

	Frecuencia	Porcentaje
Bacteria	37	9,4
Virus	4	1,0
Organismo que vive de otro	354	89,6
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio

Figura 3

Definición del término parásito.



Fuente: Encuesta de estudio.

Respecto a la tabla y figura 3, el 89.6%(354/395), de personas adultas, conoce lo que es un parásito y el 10,4% (41/395), no conoce lo que es un parásito.

Tabla 4

¿Qué es la parasitosis intestinal?.

	Frecuencia	Porcentaje
Enfermedad producida por parásitos que se localizan en el estómago.	33	8,4
Enfermedad producida por parásitos que se localizan en el intestino.	356	90,1
Enfermedad producida por parásitos que se localizan en la sangre	5	1,3
Enfermedad producida por virus.	1	,3
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 4

¿Qué es la parasitosis intestinal?.



Fuente: Encuesta de estudio.

En cuanto al conocimiento sobre parasitosis intestinal, se puede observar que el 90,1%(356/395), de personas adultas, conoce el significado y el 9,9%(39/395), no conoce.

Tabla 5

Los parásitos pueden encontrarse.

	Frecuencia	Porcentaje
En el interior de la persona	88	22,3
En el exterior de la persona	3	,8
En el medio ambiente	4	1,0
Todas las anteriores	300	75,9
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 5

Los parásitos pueden encontrarse.



Fuente: Encuesta de estudio.

Respecto a la tabla y figura 5. El 75,9%(300/395), de personas adultas, conoce donde se pueden encontrar los parásitos y el 24.1% (95/395), no conoce donde se pueden encontrar los parásitos.

Tabla 6

Edad más susceptible a los parásitos.

	Frecuencia	Porcentaje
No existe susceptibilidad en edades.	190	48,1
Los adolescentes son los más susceptibles.	4	1,0
Los niños son los más susceptibles.	192	48,6
Los adultos son los más susceptibles.	9	2,3
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 6

Edad más susceptible a los parásitos.



Fuente: Encuesta de estudio.

En cuanto al conocimiento sobre quiénes son más susceptibles, se puede observar que el 48,6% (192/395), de personas adultas conoce que los niños son los más susceptibles y un 51.4% (203/395) no conoce que los niños son los más susceptibles.

Tabla 7

Afecciones a las personas con parásitos.

	Frecuencia	Porcentaje
Pueden tener problemas respiratorios.	10	2,5
Pueden tener problemas dermatológicos	31	7,8
Pueden tener problemas en la visión.	1	,3
Todas las anteriores	353	89,4
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 7

Afecciones a las personas con parásitos.



Fuente: Encuesta de estudio.

Respecto a la tabla y figura 7. El 89,4%(353/395) de personas adultas, conoce que lo parásitos de los caninos pueden generar problemas respiratorios, dermatológicos y oftalmológicos en las personas. Mientras que el 10,6%(42/395) no conoce.

Tabla 8

Respecto a los parásitos.

	Frecuencia	Porcentaje
Una forma de contagio es por no lavarse las manos.	10	2,5
Se eliminan por las heces.	12	3,0
La desparasitación en los perros es muy importante para prevenir la transmisión de parásitos al humano.	35	8,9
Todas las anteriores.	338	85,6
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 8

Respecto a los parásitos.



Fuente: Encuesta de estudio.

Respecto a los parásitos, el 85,6%(338/395) de personas adultas, conoce que una forma de contagio es por no lavarse las manos, además que se eliminan por las heces y la desparasitación en los perros es muy importante para prevenir la transmisión al humano. Mientras que el 14,4%(57/395), no conoce.

Tabla 9

¿Cómo se daría cuenta si un niño tiene parásitos?.

	Frecuencia	Porcentaje
Lo observaría con aumento de peso.	46	11,6
Lo observaría delgado, con sueño y con bajas notas en el colegio.	336	85,1
Se mostraría con miedo y temeroso.	11	2,8
Lo observaría alegre con ganas de jugar.	2	,5
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 9

¿Cómo se daría cuenta si un niño tiene parásitos?.



Fuente: Encuesta de estudio.

Respecto a la tabla y figura 9. El 85,1% (336/395) de personas adultas, conoce que al observar a un niño delgado, con sueño y bajas notas en el colegio, podría tener parásitos. Mientras que el 14,9% (59/395) no conoce.

Tabla 10

¿Qué signos y/o síntomas presenta una persona con parásitos?.

	Frecuencia	Porcentaje
Dolor abdominal, aumento de peso.	38	9,6
Aumento de peso, cansancio.	28	7,1
Diarrea, dolor de espalda.	24	6,1
Dolor abdominal, diarrea.	305	77,2
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 10

¿Qué signos y/o síntomas presenta una persona con parásitos?.



Fuente: Encuesta de estudio.

Respecto a la tabla y figura 10. El 77,2% (305/395) de personas adultas, tiene conocimiento sobre los signos y/o síntomas que presenta una persona con parásitos. Mientras que el 22,8% (90/395) no tiene conocimiento sobre ello.

Tabla 11

Respecto a la parasitosis. Es considerado un riesgo para el humano.

	Frecuencia	Porcentaje
Dormir con la mascota.	8	2,0
Besar a la mascota.	34	8,6
Compartir alimentos con la mascota.	21	5,3
Todas las anteriores.	332	84,1
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 11

Respecto a la parasitosis. Es considerado un riesgo para el humano.



Fuente: Encuesta de estudio.

En la tabla y figura 11 se observa que el 84,1% (332/395) de personas adultas, conoce que dormir, besar y compartir alimentos con la mascotas, representan un riesgo para el hombre. Mientras que el 15,9%(63/395) no conoce.

Tabla 12

Si una persona tiene parásitos y cuenta con mascota. Lo correcto es.

	Frecuencia	Porcentaje
Desparasitarse solo la persona.	7	1,8
Desparasitar a toda su familia.	12	3,0
Desparasitar a su mascota y a su familia.	375	94,9
No desparasitarse.	1	,3
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 12

Si una persona tiene parásitos y cuenta con mascota. Lo correcto es.



Fuente: Encuesta de estudio.

En la tabla y figura 12, el 94,9%(375/395) de personas adultas, conoce que lo correcto es desparasitar a su mascota y a su familia. Mientras que el 5,1%(20/395) no conoce.

Tabla 13

Respecto al lavado de manos, lo correcto es que se realice.

	Frecuencia	Porcentaje
Después de tocar a su mascota.	71	18,0
Antes de tocar a su mascota.	3	,8
Antes y después de tocar a su mascota.	321	81,3
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 13

Respecto al lavado de manos, lo correcto es que se realice.



Fuente: Encuesta de estudio.

Como se observa en la tabla y figura 13, el 81,3% (321/395) de personas adultas, tiene conocimiento que el lavado de manos se debe de realizar antes y después de tocar a su mascota. Mientras que el 18,7%(74/395) no tiene conocimiento sobre ello.

Tabla 14

¿Cómo podemos prevenir la parasitosis en el humano?.

	Frecuencia	Porcentaje
Desparasitando a la mascota.	10	2,5
Realizando un correcto lavado de manos.	5	1,3
Realizando una buena limpieza de la casa.	1	,3
Todas las anteriores	379	95,9
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 14

¿Cómo podemos prevenir la parasitosis en el humano?.



Fuente: Encuesta de estudio.

Respecto a la tabla y figura 14, el 95,9%(379/395) de personas adultas, tiene conocimiento que desparasitando a la mascota, realizando un correcto lavado de manos y una buena limpieza de la casa, previene la parasitosis en el humano. Mientras que el 4,1% (16/395) no tiene conocimiento sobre ello.

Tabla 15

Respecto al uso de zapatos.

	Frecuencia	Porcentaje
Es una forma de prevenir la transmisión de parásitos	275	69,6
Solo se deben usar cuando llueve.	2	,5
Se deben utilizar solo cuando existe acumulación de tierra.	7	1,8
Todas las anteriores	111	28,1
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 15

Respecto al uso de zapatos.



Fuente: Encuesta de estudio.

Como se observa en la tabla y figura 15, el 69,6% (275/395) de personas adultas, tiene conocimiento que el uso de zapatos previene la transmisión de parásitos al hombre. Caso contrario, el 30,4%(120/395) no tiene conocimiento.

Tabla 16

¿Por qué es importante conocer sobre los parásitos?.

	Frecuencia	Porcentaje
Para prevenir enfermedades parasitarias solo en las mascotas.	1	,3
Para incentivar la desparasitación, como una forma preventiva de enfermedades, tanto en las personas como en el animal.	387	98,0
Para prevenir enfermedades parasitarias solo en las personas .	2	,5
Ninguna de las anteriores.	5	1,3
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 16

¿Por qué es importante conocer sobre los parásitos?.

Fuente: Encuesta de estudio.

Respecto a la tabla y figura 16, el 98%(387/395) de personas adultas, tiene conocimiento que desparasitando se previene enfermedades, tanto en las personas como en el animal. Mientras el 2% no posee este conocimiento.

Tabla 17

¿Cuál es la medida más eficiente que se debe tomar con las mascotas al sacarlas a pasear para evitar la transmisión de parásitos al humano?.

	Frecuencia	Porcentaje
Sacarlos con correa.	2	,5
Dejar que orinen en las calles.	1	,3
Recogiendo adecuadamente sus heces y desechándolas en el tacho de basura.	391	99,0
Sacarlos bien bañados.	1	,3
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 17

¿Cuál es la medida más eficiente que se debe tomar con las mascotas al sacarlas a pasear para evitar la transmisión de parásitos al humano?.



Fuente: Encuesta de estudio.

Como se observa en la tabla y figura 17, el 99%(391/395) de personas adultas, tiene conocimiento que la medida más eficiente para evitar la transmisión de parásitos al humano, es recogiendo adecuadamente las heces de los perros y desechándolas en el tacho de basura. El 1%(4/395) no tiene conocimiento sobre ello.

Tabla 18

Controlando las pulgas se pueden prevenir parásitos intestinales.

	Frecuencia	Porcentaje
No hay relación entre las pulgas y parásitos intestinales.	206	52,2
Existe relación.	4	1,0
El control de las pulgas disminuye la aparición de parásitos intestinales en el humano.	3	,8
b y c son correctas.	182	46,1
Total	395	100,0

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 18

Controlando las pulgas se pueden prevenir parásitos intestinales.



Fuente: Encuesta de estudio.

Respecto a la tabla y figura 18, el 46,1%(182/395) de personas adultas, tiene conocimiento que controlando las pulgas, se pueden prevenir parásitos intestinales en el ser humano. Mientras que el 53,9%(213/395) no tiene conocimiento sobre ello.

Tabla 19

Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

	Frecuencia	Porcentaje
No conoce	53	13,4
Conoce	342	86,6
Total	**395**	**100,0**

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 19

Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.



Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

Fuente: Encuesta de estudio.

Como se observa en la tabla 19 y figura 19, el 86,6% 342/395) de personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar, conoce sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico, no coincidiendo con los estudios de **Alvarado (2011),** donde el 28% (14/50) de padres de familia conoce sobre las medidas de prevención de parasitosis intestinal, aceptando la hipótesis alterna, donde sí existe conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

4.2. Análisis Inferencial

Tabla 20

Relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

			Conocimiento		**Total**	**Chi Cuadrado**	**P valor**
			No conoce	Conoce			
Sexo	Mujer	Recuento	34	211	245	0,117	0.732
		% dentro de Sexo del paciente	13,9%	86,1%	100,0%		
		% del total	8,6%	53,4%	62,0%		
	Varón	Recuento	19	131	150		
		% dentro de Sexo del paciente	12,7%	87,3%	100,0%		
		% del total	4,8%	33,2%	38,0%		
Total		Recuento	53	342	395		
		% dentro de Sexo del paciente	13,4%	86,6%	100,0%		
		% del total	**13,4%**	**86,6%**	**100,0%**		

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 20

Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.



Fuente: Encuesta de estudio.

Respecto a la tabla 20 y figura 20, el 87,3%(131/150) de varones adultos, tiene conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico, casi coincidiendo con **Leon, *et al* (2017),** donde menciona que el 97% (90/100) de los padres conoce sobre medidas de prevención de parasitosis intestinal. Del mismo modo el 86,1%(211/245) de mujeres adultas, conoce sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico, no coincidiendo con **Changa (2018),** donde solo el 54,4% (173/318) de madres conoce sobre medidas preventivas de parasitosis intestinal, de igual manera no coincidiendo con **Paucar (2021), Kassaw, *et al* (2020)** y **Romani y Quispe (2019),** donde el 40% (29/72), 45,8% (171/378) y el 18,3% (17/93) conoce sobre las medidas preventivas de parasitosis intestinal respectivamente.

En relación entre el conocimiento y el sexo, no existe relación entre ambas variables (p=0,732), es decir que cualquier sexo tiene el mismo conocimiento sobre la prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico, concluyendo que se acepta la hipótesis nula, donde no existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

Tabla 21

Relación del conocimiento *sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.*

			Nivel de conocimiento		**Total**	**Chi cuadrado**	**P valor**
			No conoce	Conoce			
Edad	18-29 jóvenes	Recuento	34	203	237	0,439	0,507
		% dentro de Edad del paciente	14,3%	85,7%	100,0%		
		% del total	8,6%	51,4%	60,0%		
	30-60 adultos	Recuento	19	139	158		
		% dentro de Edad del paciente	12,0%	88,0%	100,0%		
		% del total	4,8%	35,2%	40,0%		
Total		Recuento	53	342	395		
		% dentro de Edad del paciente	13,4%	86,6%3	100,0%		
		% del total	**13,4%**	**86,6%**	**100,0%**		

Fuente: Encuesta de estudio.

Figura 21

Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.



Fuente: Encuesta de estudio.

Como se observa en la tabla 21 y figura 21, el 85,7% (203/237) de jóvenes adultos (18-29 años) y el 88% (139/158) de personas adultas (30-60 años) conoce sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico, no coincidiendo con **Sanchez, *et al* (2013),** donde el 60% (3/5) de madres adultas mayores (más de 60 años), conoce suficientemente sobre las medidas de prevención de parasitosis, del mismo modo no coincidiendo con los jóvenes (20 a 24 años) donde el 25% (3/12) conoce sobre el tema.

En relación entre el conocimiento y la edad, no existe relación entre ambas variables (p=0,507), es decir que cualquier edad tiene el mismo conocimiento sobre la prevención de la parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico, concluyendo que se acepta la hipótesis nula, donde no existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

CONCLUSIONES

- El 86,6% (342/395) de personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021, conoce sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico.

- El 87,3% (131/150) de varones adultos que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito Magdalena del Mar-Lima 2021, conoce sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico.

- El 86,1% (211/245) de mujeres adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021, conoce sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico.

- El 85,7% (203/237) de jóvenes adultos (18-29 años) que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021, conoce sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico.

- El 88% (139/158) de personas adultas (30-60 años) que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021, conoce sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico.

- No existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

- No existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

SUGERENCIAS

- Se sugiere considerar el rango adulto mayor en las encuestas, para poder determinar el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico.

- Se sugiere comparar el conocimiento que tienen las personas adultas que asisten a diferentes Veterinarias del distrito mencionado sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico.

- Se sugiere comparar el conocimiento que tienen las personas adultas que asisten a Veterinarias de distritos aledaños sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alvarado, Y. (2011). Nivel de conocimiento sobre parasitosis, de los padres de familia de los alumnos de la “Escuela Vicente Bastidas R” del barrio Clodoveo Jaramillo, de la ciudad de Loja, y su influencia en el rendimiento académico, durante el periodo marzo-agosto 2011. Tesis previa a la obtención de título de Médico General. Universidad Nacional de Loja; Loja.

Ayala, I. Doménech, I. Rodríguez, M. y Urquiaga, A. (2012). Parasitismo intestinal por *Dipylidium caninum*. Revista Cubana de Medicina Militar; 191-194.

Calderón, A. Vásquez, B. Vásquez, C. Moreno, D. Ordoñez, F. Rojas, N. Torres, P. y Ponce, R. (2021). Fundamentos de Salud Pública. Recuperado el 17 de junio de 2021. http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4514.pdf.

Cando, V. (2016). Evaluación del conocimiento sobre medidas preventivas para evitar la infección por parásitos intestinales en niños que asisten a la escuela Leonidas García durante el periodo Abril-Mayo, 2016. Proyecto de investigación previa la obtención del grado académico de Magister en Farmacia Clínica y Hospitalaria. Universidad Regional Autónoma de los Andes; Ambato.

Castro, V. Cerdeira, V. y Pascual, M. (2002). Larva migrans cutánea: diagnóstico de sospecha y tratamiento en Atención Primaria. Medifam; 77-81.

Chacín, L. (2013). Las enfermedades parasitarias intestinales como un problema de salud global. Invest Clin; 1-4.

Changa, R. (2018). Asociación entre el nivel de conocimiento sobre parasitosis intestinal y sus medidas preventivas de madres de niños entre las edades de 5 a 12 años que acuden al Hospital de Vitarte durante el año 2017. Tesis para optar el Título de Médico Cirujano. Universidad Ricardo Palma. Lima.

Choc, L. (2018). Larva migrans cutánea por Ancylostoma spp. en habitantes de la costa del Pacífico de Guatemala. UNA; 1-3.

Coniel, E. Tomás, M. Reinoso, A. Cruz, A. y Díaz, P. (2012). Evaluación de conocimientos sobre zoonosis en personas que conviven con animales: Necesidad de intervención educativa. REDVET; 1-14.

Dabanchi, J. (2003). Zoonosis. Rev Chil Infect; 47-51.

Del Barco, Ó. Álvarez, P. y López, R. (2009). Parasitosis intestinal. Formación Médica Continuada en Atención Primaria; 14-24.

Elisa, M. (2019). Introducción a la Parasitología Médica. Buenos Aires: Facultad de Medicina de Buenos Aires.

Esparza, l. (2019). Conocimientos sobre prevención de parasitosis intestinal en madres con niños menores de 5 años del Barrio Nuevo Amanecer de la ciudad de Loja. Tesis previa a la obtención del título de licenciada en enfermería. Universidad Nacional de Loja; Loja.

Flores, C. y Seminario, V. (2019). Conocimientos, actitudes y prácticas de las madres para prevenir parasitosis intestinal en niños preescolares. Caserío Cruz del Médano, Mórrope-2018. Tesis para optar el Título de Licenciado en Enfermería. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; Chiclayo

Fumadó, V. (2015). Parasitosis intestinales. Barcelona: Pediatría Integral.

Gutiérrez, C. Trujillo, B. Martínez, A. Pineda, A. y Millán, R. (2007). Frecuencia de helmintiasis intestinal y su asociación con deficiencia de hierro y desnutrición en niños de la región occidental de México. Gaceta Médica de México; 297-300.

Huapaya, P. Espinoza, Y. Roldán, W. y Jiménez, S. (2009). Toxocariosis humana: ¿problema de salud pública?. An Fac med; 283-290.

Iannacone, J. Benites, M. y Chirinos, L. (2006). Prevalencia de infección por parásitos intestinales en escolares de primaria de Santiago de Surco, Lima, Perú. Parasitología Latinoamericana; 54-62.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2016). Porcentaje de población por etapas de vida. Recuperado el 10 de noviembre de 2021. http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/indicadoresSalud/demograficos/poblaciontotal/POBVIDMacros.asp.

Kassaw, M et al (2020). Knowledge, Attitude and Practice of Mothers on Prevention and Control of Intestinal Parasitic Infestations in Sekota Town, Waghimra Zone, Ethiopia. Pediatric Health, Medicine and Therapeutics; 161-169.

León, C. Tucto, K. y Valdivia, G. (2017). Nivel de conocimiento sobre parasitosis intestinal en padres de niños de 2 a 5 años que acuden al servicio de laboratorio clínico del Centro de Salud “Ex Fundo Naranjal”,San Martín de Porres 2015. Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería. Universidad de Ciencias y Humanidades. Los Olivos.

Martínez, I. Gutierrez, M. Ruiz, L. Fernández, A. Gutiérrez, E. Aguilar, J. Michael, S. y Gaona, E. (2014). Dipilidiasis: Una zoonosis poco estudiada. Rev Latinoam Patol Clin Med Lab; 102-107.

Martínez, D. Arrieta, M. Ampudia, A. Fernández, M. Hernández, S. Hoyos, F. Lozano, C. Moreno, M. Negrete, E. Lima, M. Parada, O. Romero, Y. Pinto, M. y Rangel, E. (2010). Parasitosis. Ciencia y Salud; 122-129.

Méndez, P. Rodríguez, P. y Sandín, I. (2018). Urticaria y Angioedema. Pediatr Integral; 125-137.

Mohan, H. Bal, A. y Dhabi, G. (2006). Non-infectious granulomatous dermatitis. A clinicopathological study. Journal of Cutaneous Pathology; 767-771.

Neira, P. Jofré, L. y Muñoz, N. (2008). Infección por *Dipylidium caninum* en un preescolar. Presentación del caso y revisión de la literatura. Rev Chil Infect*;* 465-471.

Nidia, Bustos. Broncoespasmo en Anestesia. Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica; 421 – 424.

Pardo, E. Y Buitrago, M. (2005). Parasitología Veterinaria I. Managua: Universidad Nacional Agraria.

Paucar, E. (2021). Conocimientos sobre parasitosis intestinal en las madres de niños de 3 a 5 años de una Institución Educativa Inicial de Lima Este -2019. Tesis para optar el Título de Enfemería en Salud y Desarrollo integral infantil. Universidad Norbert Wiener. Lima

Peña, G. (2016). Conocimiento y prácticas en la prevención de parasitosis intestinal por las madres que acuden al centro de salud Carlos Showing Ferrari, Amarilis Huánuco 2015*.* Tesis para optar el título profesional de licenciada en enfermería*.* Universidad Nacional Hermilio Valdizán; Huánuco.

Peralta, S. Guerrero, T. y López, E. (2019). Conocimientos, actitudes y prácticas acerca de Parasitosis intestinal en adultos que asistieron a Consulta de atención primaria en la comunidad de Paya Municipio Baní, provincia Peravia, República Dominicana durante el periodo mayo-junio 2018. Ciencia y Salud; 69-78.

Plascencia, A. H, Proy. Eljure, N. Atoche, C. Calderón, C. y A, Bonifaz. (2013). Larva migrans cutánea relacionada con Ancylostomas. Dermatol Rev; 454-460.

Rodriguez, G. (2014). Incidencia de parasitismo intestinal en los manipuladores de alimentos del malecon turistico del puerto de la Libertad. marzo-julio 2014. Informe final de Investigación. Universidad de el Salvador. San salvador.

Roldán, W. Espinoza, Y. Huapaya, P. y Jiménez, S (2010). Diagnóstico de la Toxocariosis Humana. Rev Peru Med Exp Salud Pública; 613-260.

Romani, N. y Quispe, L. (2019). Conocimiento sobre parasitosis intestinal en madres con niños de 2 a 5 años. Centro de Salud Santiago–Ica, 2019. Investigación desarrollada para optar el título de Licenciada en Enfermería. Universidad Autónoma de Ica.

Saari, S. Näreaho, A. y S, Nikander. (2019). Canine Parasites and Parasitic Diseases. Finlandia: Elsevier.

Sanchez, M. Gonzáles, T. Ayora, T. Evangelista, Z. y Pacheco, N. (2017). ¿Qué son los microbios?. Rev. Ciencia; 10-17.

Sanchez, R. Sánchez, W. Sánchez, Y. y Medina, M. (2013). Nivel de conocimiento sobre las medidas de prevención de parasitosis por las madres que acuden al Puesto de Salud “Las Flores”, Santiago de Surco, Lima. Horizonte Médico; 21-31.

Schlossber, D. (2013). Clinical Infectious Diseases. Cambridge: Cambridge University Press.

Strube, C. y Mehlhorn, H. (2021). Dog Parasites Endangering Human Health. Düsseldorf: Springer.

Thomas, B. Murray, B y Murphy, D. (2017). Encyclopedia of Applied Plant Sciences. Perth: Elsevier.

Toro L. (2009). La Clínica y el laboratorio. Medellin: Edimeco.

Tuesta, M. (2016). Conocimiento de las madres sobre parasitosis intestinal en niños de 6 meses a 2 años que acudieron al control de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Palo de Acero – Huánuco. Trabajo de Investigación para optar el título de Especialista de Enfermería Pediátrica. UNMSM; Lima.

Roldán, W. Espinoza, Y. Huapaya, P y Jiménez, S. (2010). Diagnóstico de la Toxocariosis Humana. Rev Peru Med Exp Salud Pública; 613-260.

Valdivieso, Josefa. Valenzuela, Marcela. (2015). Disnea. Santiago de Chile: Universidad Finis Terrae.

Weaver, R. Angle, S. Bottomley, P. Bezdicek, D. Smith, S. Tabatabai, A. y Wollum Art. (1994.). Methods of Soil Analysis: Part 2 Microbiological and Biochemical Properties. Oregon: Soil Science Society of America.

Zoilo, M. (2012). Clasificación de las Vasculitis Sistémicas en Pediatría. Pediatría; 121-130.

NOTA BIBLIOGRÁFICA

Fecha de Nacimiento: 30 de Noviembre de 1995.

Estudios primarios: San Ignacio de Loyola.

Estudios secundarios: Bertolt Brecht.

Universidad de Egreso: Universidad Alas Peruanas.

Actualmente trabajo en la Veterinaria Rubio.

ANEXOS

ANEXO 01

MATRÍZ DE CONSISTENCIA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

I. Título	II. Problema	III. Objetivos	IV. Hipótesis	V. Variables	VI. Diseño	VII. Población (N)
"Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021".	**Problema general.** ¿Cuál es el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021?. **Problemas específicos:** ¿Cuál será la relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021?. ¿Cuál será la relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021?.	**Objetivo General** Determinar el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. . **Objetivos Específicos** Determinar la relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. Determinar la relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.	**Hipótesis General** **Ho:** No existe conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. **Ha:** Sí existe conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. **Hipótesis específicas:** **Ho1:** No existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. **Ha1:** Sí existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según sexo, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. **Ho2:** No existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo	**V. Independiente** Personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria. **V. Dependiente** Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico.	El diseño de investigación es no experimental.	La población objeto de estudio estuvo representada por personas mayores de 18 hasta 60 años que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar, la cantidad de propietarios de canes que acuden a la Veterinaria anualmente es de 20 000 personas.

			zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. **Ha2:** Sí existe relación del conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas según rango de edad, que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.			

IX. Muestra	**X. Unidad de Análisis u observación**	**XI. Criterios de Inclusión y exclusión**	**XII. Métodos de Recolección de Datos e Instrumentos**	**XII. Fuentes de Información**	**XIV. Pruebas estadísticas**
Para mayor realce se encuestó a 395 personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar, Lima. Adultos mayores de 18 hasta 60 años. Repartidos en dos rangos de 18-29 años y adultos de 30-60 años **(INEI, 2016).**	Cada una de la personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena de Mar, Lima.	**Criterios de Inclusión** Personas adultas de 18 hasta 60 años que viven en el distrito de Magdalena del Mar. Propietarios de canes que asisten a la Clínica Veterinaria. Personas de ambos sexos. **Criterios de Exclusión.** Personas menores de 18 años y mayores de 60 años. Personas adultas que no viven en el distrito de Magdalena del Mar. Propietarios de canes que no asisten a la Clínica Veterinaria,	Cuestionario virtual **(anexo 03)**	Fuentes Primarias. La información se obtendrá a través del cuestionario virtual.	Tablas y gráficos, empleando el paquete estadístico SPSS. Ver. 25.0.

ANEXO 02

EVALUACIÓN DE EXPERTO

Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un instrumento (cuestionario) para investigación, titulado: **CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL CANINA CON RIESGO ZOONÓTICO EN PERSONAS ADULTAS QUE ASISTEN A UNA CLÍNICA VETERINARIA DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA 2021.**

Se le alcanza el instrumento para su evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos llegar sus apreciaciones para cada ítem.

A continuación sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa en la casilla que usted considere conveniente.

Ítem	RELEVANCIA		COHERENCIA		SUFICIENCIA		CLARIDAD EN LA REDACCIÓN	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
1	x		x		x		x	
2	x		x		x		x	
3	x		x		x		x	
4	x		x		x		x	
5	x		x		x		x	
6	x		x		x		x	
7	x		x		x		x	
8	x		x		x		x	
9	x		x		x		x	
10	x		x		x		x	
11	x		x		x		x	
12	x		x		x		x	
13	x		X		X		X	
14	x		X		X		X	
15	x		X		X		X	
16	x		X		X		X	

Aspectos generales

	Si	No
El instrumento contiene instrucciones claras y precisas.	x	
Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación.	x	
Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.	x	
El número de ítems es suficiente para recoger la información.	x	

Aplicabilidad

a) Deficiente

b) Baja

c) Regular

d) Buena

e) Muy buena x

Datos del evaluador:
Nombre y Apellidos: Luciano Agustín Casas
Dirección: 12 n° 430 La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Título profesional: Médico Veterinario
Grado académico: Profesor Adjunto de Clínica de Pequeños Animales



FIRMA

ANEXO 03

CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL CANINA CON RIESGO ZOONÓTICO EN PERSONAS ADULTAS QUE ASISTEN A UNA CLÍNICA VETERINARIA DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA 2021.

Estimado(a), el presente cuestionario permitirá determinar el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. Es importante contar con la información más honesta, ya que las personas pueden contraer enfermedades parasitarias, debido al contacto estrecho que tienen con la mascota.

Aviso de confiabilidad

Los datos recolectados mediante el presente cuestionario, serán utilizados con la finalidad de determinar el conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021. El presente instrumento es confidencial.

Cuestionario

Nombre y apellido : _____

Edad : Entre 18-29 años.

Entre 30-60 años.

Sexo : Varón

Mujer

1. Un parásito es:

a) Bacteria.

b) Virus.

c) Organismo que vive de otro.

d) Hongo.

2. ¿Qué es la parasitosis intestinal?

a) Enfermedad producida por parásitos que se localizan en el estómago

b) Enfermedad producida por parásitos que se localizan en el intestino

c) Enfermedad producida por parásitos que se localizan en la sangre.

d) Enfermedad producida por virus.

3. Los parásitos pueden encontrarse:

a) En el interior de la persona.

b) En el exterior de la persona.

c) En el medio ambiente.

d) Todas las anteriores.

4. Son los más susceptibles

a) No existe susceptibilidad en edades.

b) Los adolescentes son los más susceptibles.

c) Los niños son los más susceptibles.

d) Los adultos son los más susceptibles.

5. Las personas con parásitos

a) Pueden tener problemas respiratorios.

b) Pueden tener problemas dermatológicos.

c) Pueden tener problemas en la visión.

d) Todas las anteriores.

6. Respecto a la parásitos

a) Una forma de contagio es por no lavarse las manos.

b) Se eliminan por las heces.

c) La desparasitación en los perros es muy importante para prevenir la transmisión de parásitos al humano.

d)Todas las anteriores.

7. ¿Cómo se daría cuenta si un niño tiene parásitos?

a) Lo observaría con aumento de peso.

b) Lo observaría delgado, con sueño y con bajas notas en el colegio.

c) Se mostraría con miedo y temeroso.

d) Lo observaría alegre con ganas de jugar.

8. ¿Qué signos y o síntomas presenta una persona con parásitos?

a) Dolor abdominal, aumento de peso.

b) Aumento de peso, cansancio.

c) Diarrea, dolor de espalda.

d) Dolor abdominal, diarrea.

9. Respecto a la parasitosis. Es considerado un riesgo para el humano

a) Dormir con la mascota.

b) Besar a la mascota.

c) Compartir alimentos con la mascota.

d) Todas las anteriores

10. Si una persona tiene parásitos y cuenta con mascota. Lo correcto es

a) Desparasitarse solo la persona.

b) Desparasitar a toda su familia.

c) Desparasitar a su mascota y a su familia.

d) No desparasitarse.

11. Respecto al lavado de manos, lo correcto es que se realice

a) Después de tocar a su mascota.

a) Antes de tocar a su mascota.

b) Antes y después de tocar a su mascota.

c) No lavarse las manos.

12. ¿Cómo podemos prevenir la parasitosis en el humano?

a) Desparasitando a la mascota.

b) Realizando un correcto lavado de manos.

c) Realizando una buena limpieza de la casa.

d) Todas las anteriores.

13. Respecto al uso de zapatos

a) Es una forma de prevenir la transmisión de parásitos.

b) Solo se deben usar cuando llueve.

c) Se deben utilizar solo cuando existe acumulación de tierra.

d) No es una forma de prevenir la transmisión de parásitos.

14. ¿Por qué es importante conocer sobre los parásitos?

a) Para prevenir enfermedades parasitarias solo en las mascotas.

b) Para incentivar la desparasitación, como una forma preventiva de enfermedades, tanto en las personas como en el animal.

c) Para prevenir enfermedades parasitarias solo en las personas .

d) Ninguna de las anteriores.

15.¿Cuál es la medida más eficiente que se debe tomar con las mascotas al sacarlas a pasear para evitar la transmisión de parásitos al humano?

a) Sacarlos con correa.

b) Dejar que orinen en las calles.

c) Recogiendo adecuadamente sus heces y desechándolas en el tacho de basura.

c) Sacarlos bien bañados.

16. Controlando las pulgas se pueden prevenir parásitos intestinales

a) No hay relación entre las pulgas y parásitos intestinales.

b) Existe relación.

c) El control de las pulgas disminuye la aparición de parásitos intestinales en el humano.

d) b y c son correctas.

RESPUESTAS CORRECTAS

ITEM	
1	C
2	B
3	D
4	C
5	D
6	D
7	B
8	D
9	D
10	C
11	C
12	D
13	A
14	B
15	C
16	D

ANEXO 04

BASE DE DATOS

	Dirección de correo electró	Puntuación Vives en el distrito de Magd	Nombre y apellido	Edad	Sexo	1. Un parásito es:	2. ¿Qué es la parasitosis int	3. Los parásitos pueden:	4. Son los más suscep	5. Las personas con p	6. Respecto a los parás	7. ¿Cómo se dan la cuenta	8. ¿Qué signos y ¿o sín	9. Respecto a la parasitosis. Es considerado un riesgo para el humano	10. Si una persona tiene parásitos y cuenta con masc	11. Respecto al lavado de manos	12. ¿Cómo podemos prevenir la parasitosis en el humano	13. Respecto al uso de zapatos.	14. ¿Por qué es importan	15. ¿Cuál es la medida	16. Controlando las pulgas se pueden prevenir parásitos intestinales
1	8/26/2021 16:10:03	isabelanavarro2701@gmail.	12 / 16	Si	Isabela Navarro Ugarte	Entre 30-60 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	a) En el interior de la persona	Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	a) Un riesgo para el humano	c) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para prevenir enfermedad	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
2	8/26/2021 16:45:41	elaine24ubill@gmail.com	12 / 16	No	Aiden Fernandez	Entre 18-29 años.	Hombre	a) Bacteria.	b) Enfermedad producida por	En el medio ambiente.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	a) Un riesgo para el humano	c) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	c) Se deben utilizar solo cuando existe acuti	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
3	8/26/2021 17:45:40	juanchovivas1999@gmail.c	10 / 16	Si	Juan Andrés vivas ventoso	Entre 18-29 años.	Hombre	a) Bacteria.	b) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Pueden tener problemas	c) Todas las anteriores	a) Un riesgo para el humano	a) Despasitar a su mascota y a su familia.	a) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) Después de tocar a su mascota.	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
4	8/26/2021 17:52:55	andrik.perez@pucp.pe	10 / 16	Si	Andrik perez	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a toda su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	b) Realizando un correcto lavado de manos.	a) Es una forma de prevenir la transmisión	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	El control de las pulgas disminuye la aparición de parásitos intestinales en el humano.
5	8/26/2021 17:53:12	sandronch@gmail.com	13 / 16	Si	Eder Navarro	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	a) Una forma de contagio e	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
6	8/26/2021 17:53:15	yoa.96.03@gmail.com	13 / 16	No	Yomita Quijaite	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
7	8/26/2021 17:53:45	pooglo30.3l6@gmail.com	14 / 16	Si	Jennifer Cabrera	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	a) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
8	8/26/2021 17:53:43	laugusto_jl@hotmail.com	12 / 16	Si	Iván Pareja	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
9	8/26/2021 17:54:48	nicolasfabricio0808@gmail.c	12 / 16	Si	Nicolás Aguirre	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	a) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
10	8/26/2021 17:55:24	patyluc01@gmail.com	13 / 16	Si	Patricia Ku Tong Ruiz	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
11	8/26/2021 17:59:37	kaitobiano@hotmail.com	11 / 16	Si	Kaito Biano	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	c) La despasitación en todo	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) Despasitandolo a la mascota.	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
12	8/26/2021 18:00:15	gamigotos@gmail.com	14 / 16	No	Estrella Pintado Godos	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	a) Un riesgo para el humano	a) Despasitar a su mascota y a su familia.	a) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) Es una forma de prevenir la transmisión	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
13	8/26/2021 18:05:28	yasmipazcotidanflores@hot	11 / 16	Si	Yasmi Paz Soldan	Entre 18-29 años.	Mujer	a) Bacteria.	a) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Ninguna de las anteriores	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
14	8/26/2021 18:19:54	salenes@gmail.com	14 / 16	Si	Salene Serrato	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	a) Una forma de contagio e	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
15	8/26/2021 18:27:01	julexpaulet@gmail.com	10 / 16	Si	julee paulet	Entre 18-29 años.	Mujer	a) Bacteria.	b) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Ninguna de las anteriores	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
16	8/26/2021 18:30:59	sapatadayanne@gmail.com	11 / 16	Si	Dayanne Zapata	Entre 18-29 años.	Mujer	b) Virus.	b) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	Los niños son los más sucs	Pueden tener problemas	La despasitación en todo	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
17	8/26/2021 18:33:22	juanchucini96@hotmail.com	13 / 16	No	Juan chucini	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	a) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	c) Realizando una buena limpieza de la casa.	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
18	8/26/2021 18:57:18	Gleciasiemes.96@gmail.cor	12 / 16	Si	Grecia Ramírez Huamán	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	a) Una forma de contagio e	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
19	8/26/2021 19:09:21	smendozamca@gmail.com	7 / 16	Si	Sergio Alexander Mendoza	Entre 18-29 años.	Hombre	a) Bacteria.	a) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	b) Los adolescentes son los	Pueden tener problemas	Se eliminan por las heces	b) Un riesgo para el humano	c) Despasitar a su mascota y a su familia.	a) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	c) Se deben utilizar solo cuando existe acuti	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
20	8/26/2021 19:19:05	michelle.rbca@gmail.com	12 / 16	No	Michelle Rioja	Entre 30-60 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	b) Se eliminan por las heces	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) No es una forma de prevenir la transmisió	Ninguna de las anteriores	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
21	8/26/2021 19:19:10	nvicet882@gmail.com	13 / 16	No	Melanny	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	b) Se eliminan por las heces	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) No es una forma de prevenir la transmisió	Ninguna de las anteriores	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
22	8/26/2021 19:19:19	vioni.diegogamboa@hotma	14 / 16	No	Xiomara diego	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Ninguna de las anteriores	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
23	8/26/2021 19:25:52	najhonny.bardaji@gmail.cor	12 / 16	Si	Najhonny Bardaji	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	El control de las pulgas disminuye la aparición de parásitos intestinales en el humano.
24	8/26/2021 19:31:13	suesilvertres_m@cbtcu2.com	16 / 16	Si	Sue Silvertres	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
25	8/26/2021 20:12:13	pedro.salguero598@gmail.c	12 / 16	Si	Pedro Salguero	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Ninguna de las anteriores	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
26	8/26/2021 20:18:45	914444808@gmail.com	7 / 16	No	Ingrid Bueno	Entre 18-29 años.	Mujer	a) Bacteria.	a) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	c) La despasitación en todo	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Ninguna de las anteriores	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
27	8/26/2021 20:31:18	kellyloreal0108@gmail.com	15 / 16	Si	Lorena de la cruz	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Ninguna de las anteriores	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
28	8/26/2021 20:36:46	janethbg@gmail.com	14 / 16	Si	Janeth bi Guerrero Cordova	Entre 30-60 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Ninguna de las anteriores	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
29	8/26/2021 20:56:10	ichauca@pucp.pe	13 / 16	Si	Manuel Chauca Tantalo	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	c) La despasitación en todo	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
30	8/26/2021 22:24:50	eduardex2401@gmail.com	11 / 16	Si	Eduardo Gonzalez	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	a) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	b) Solo se deben usar cuanto tueve.	c) Para prevenir enfermedad	Recogiendo adecuadamen	El control de las pulgas disminuye la aparición de parásitos intestinales en el humano.
31	8/27/2021 0:05:25	francomujica422@gmail.com	12 / 16	Si	Franco Mujica	Entre 18-29 años.	Hombre	a) Bacteria.	b) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	d) Los adultos son los más sc	Pueden tener problemas	c) Se recetaría con medic	a) Un riesgo para el humano	a) Despasitar a su mascota y a su familia.	a) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) Es una forma de prevenir la transmisión	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	Existe relación
32	8/27/2021 0:17:42	babymsicclasic@gmail.com	16 / 16	No	Maria Gisella Bartolini Alegr	Entre 30-60 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
33	8/27/2021 0:20:43	brayan.silanz1@gmail.com	15 / 16	No	Brayan Silva	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
34	8/27/2021 0:22:21	marcelo.alex4@gmail.com	13 / 16	Si	Marcelo Alex Fernandez	Entre 18-29 años.	Mujer	a) Bacteria.	a) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
35	8/27/2021 0:30:20	marilusa.armijo@gmail.com	14 / 16	No	Marilusa Armijo	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Ninguna de las anteriores	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
36	8/27/2021 0:31:46	bolivr.ruos@gmail.com	12 / 16	No	Victor Bolivar	Entre 30-60 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	a) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
37	8/27/2021 0:35:06	lobato80@outlook.com	13 / 16	No	Juan José Vázquez	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	a) Una forma de contagio e	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
38	8/27/2021 0:57:26	edazs2110@gmail.com	11 / 16	No	Sebastian Diaz	Entre 30-60 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	a) Una forma de contagio e	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	c) Se deben utilizar solo cuando existe acuti	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
39	8/27/2021 2:57:48	willyqc_yo@hotmail.com	9 / 16	Si	Willy alexandr el Atauchi Pall	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	No existe susceptibilidad b	Pueden tener problemas	La despasitación en todo	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
40	8/27/2021 8:27:40	Melisamariaisi@hotmail.com	16 / 16	No	Melina Chirea	Entre 30-60 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) Es una forma de prevenir la transmisión	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
41	8/27/2021 9:07:32	raissaalepe@gmail.com	14 / 16	Si	Raissa Peña	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	a) Una forma de contagio e	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) Es una forma de prevenir la transmisión	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
42	8/27/2021 10:12:40	dcenturion2002@gmail.com	14 / 16	Si	Diego centurión	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
43	8/27/2021 10:17:49	jagz94@gmail.com	10 / 16	No	Jorge Gomez de la Torre	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	a) Una forma de contagio e	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
44	8/27/2021 10:29:30	jestarta@gmail.com	14 / 16	No	JACKELINE SARMIENTO TE	Entre 30-60 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
45	8/27/2021 10:31:24	xxd20144@gmail.com	8 / 16	No	Carlos Mariño Rivas	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	No existe susceptibilidad b	Pueden tener problemas	a) Una forma de contagio e	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	a) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) Después de tocar a su mascota.	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
46	8/27/2021 10:44:28	jbdoig@gmail.com	12 / 16	No	Joshua Bellido	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
47	8/27/2021 10:46:04	rbobsley@gmail.com	12 / 16	Si	Rizbeh Bobsley	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	a) Una forma de contagio e	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
48	8/27/2021 11:02:59	hilaryvalente.9@hotmail.com	13 / 16	Si	Hilary Valente Rivapalma	Entre 18-29 años.	Mujer	a) Bacteria.	b) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
49	8/27/2021 11:09:06	douglasicher@gmail.com	11 / 16	No	Douglas Chirinos	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
50	8/27/2021 11:15:49	arianacaballeros@gmail.c	12 / 16	No	Ariana Caballero	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
51	8/27/2021 11:16:11	moises_laboada@hotmail.c	15 / 16	Si	Moisés Adriano Taboada Tel	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
52	8/27/2021 11:17:33	dafloro532@gmail.com	13 / 16	Si	Perez	Entre 18-29 años.	Mujer	a) Bacteria.	b) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
53	8/27/2021 11:20:09	jose9_cremas@outlook.es	4 / 16	No	Jose Arguedas	Entre 18-29 años.	Hombre	b) Virus.	b) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	Los adolescentes son los	Pueden tener problemas	a) Una forma de contagio e	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	a) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	a) Despasitandolo solo la persona.	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
54	8/27/2021 11:56:52	arainero28@hotmail.com	10 / 16	Si	Armando	Entre 30-60 años.	Hombre	a) Bacteria.	b) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
55	8/27/2021 11:59:24	jorguera482@gmail.com	13 / 16	Si	Jon Iglu Guerra Arive	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
56	8/27/2021 12:15:32	luisrodriguez8@cbtcu2.com	9 / 16	Si	Luis rodriguez	Entre 18-29 años.	Hombre	a) Bacteria.	b) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	b) Antes de tocar a su mascota.	b) Realizando un correcto lavado de manos.	b) Solo se deben usar cuanto tueve.	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
57	8/27/2021 12:35:45	oscarcopaseadarios@gmail.	11 / 16	No	Randu copara sedano	Entre 18-29 años.	Hombre	a) Bacteria.	b) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	No existe susceptibilidad b	Pueden tener problemas	a) Una forma de contagio e	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
58	8/27/2021 15:11:57	dorgywen@gmail.com	13 / 16	Si	Debby Galvez	Entre 30-60 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
59	8/27/2021 15:37:40	mariogalvez05@gmail.com	12 / 16	Si	Mario Gálvez Ayala	Entre 30-60 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	c) Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	c) La despasitación en todo	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	a) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
60	8/27/2021 15:45:50	rominapadilla1030@gmail.co	9 / 16	No	Romina padilla	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
61	8/27/2021 16:40:46	frankicc151@gmail.com	14 / 16	Si	Frank Cocicca	Entre 18-29 años.	Hombre	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	Todas las anteriores.	a) No existe susceptibilidad d	Todas las anteriores.	d) Todas las anteriores	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y a su familia.	c) Antes y después de tocar a su mascota.	d) Todas las anteriores.	d) No es una forma de prevenir la transmisió	Para incentivar la despaci	Recogiendo adecuadamen	3 y con correctas.
62	8/27/2021 17:57:43	dijaviag@hotmail.com	12 / 16	Si	Karina Montalvo	Entre 18-29 años.	Mujer	c) Organismo que vive de otro	d) Enfermedad producida por	En el interior de la persona	Los niños son los más sucs	Todas las anteriores.	b) Un riesgo para el humano	b) Despasitar a su mascota y

| | | |

| | | |

ANEXO 05

Categorización del Conocimiento sobre prevención de parasitosis intestinal canina con riesgo zoonótico en personas adultas que asisten a una Clínica Veterinaria del distrito de Magdalena del Mar-Lima 2021.

Se determinó el promedio (x) X= 12



PUNTAJE:

Conoce: 13-20 puntaje.

No conoce: 0-12 puntaje.

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD

El director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que suscribe, hace constar:

Que el Informe de Tesis titulado **"CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL CANINA CON RIESGO ZOONÓTICO EN PERSONAS ADULTAS QUE ASISTEN A UNA CLÍNICA VETERINARIA DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA 2021",** Presentada, por el Bachiller en Medicina Veterinaria, **ROMERO LEIVA, Camilo André**. Tiene un índice de similitud del **19%,** verificable en el reporte final del análisis de originalidad, mediante el Software Turniting. Se concluye, que las coincidencias detectadas no constituyen plagio y cumple con uno de los requisitos estipulados en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional "Hermilio Valdizán" de Huánuco.

Huánuco, 25 de junio del 2022

Dr. José Goicochea Vargas
Director de Investigación. FMVZ

Cayhuayna Alta S/N° Av. Universitaria (altura Garita de Control) – Pillco Marka – Huánuco. PERÚ.
Cel: 962090021, e-mail: jgoicochea@unheval.edu.pe

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE MÉDICO VETERINARIO

En la ciudad de Huánuco - Distrito de Pillco Marca, a los nueve días del mes de abril del 2022, siendo las 4:00 pm, en cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos, se reunieron a través de la Plataforma de Video Conferencia Cisco Webex en el Aula Virtual N°301- VET. 04 https://unheval.webex.com/unheval/j.php?MTID=m87b893247f87a76ac3ee533f66dc8386. Los miembros integrantes del Jurado examinador de la Sustentación de Tesis Titulada **CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL CANINA ZOONÓTICOS EN PERSONAS ADULTAS EN LA CLINICA VETERINARIA "PET S SMILE" DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR – LIMA 2021**, del Bachiller **CAMILO ANDRÉ ROMERO LEIVA**, para **OBTENER EL TÍTULO DE MÉDICO VETERINARIO**. Jurado integrado por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Dr. **Rosel APAESTEGUI LIVAQUE**

SECRETARIO: Dr. **Julio Cesar DIAZ ZEGARRA**

VOCAL : **Mg. Walter Richard TASAYCO ALCANTARA**

ASESOR DE TESIS: Dr. **Miguel Chuquiyauri Talenas**

Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado y público asistente.
Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del aspirante a Médico Veterinario, teniendo presente los criterios siguientes:

a. Presentación personal.
b. Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, contribución a la ciencia y solución a un problema social y recomendaciones.
c. Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes del Jurado y público asistente.
d. Dicción y dominio de escenario.

Así mismo, el Jurado planteó a la tesis las siguientes observaciones:

- Reformular el título de la tesis
- Reformular la población en base a los que asisten a la clínica

Finalizado el acto de sustentación, los miembros del Jurado procedieron a la calificación, cuyo resultado fue: **APROBADO** con la Nota de **QUINCE** (15) con la mención de **BUENO**

Con lo que se dio por finalizado el proceso de Evaluación de Sustentación de Tesis. Siendo a horas **17:00 HORAS**., en fe de la cual firmamos:

Dr. Rosel APAESTEGUI LIVAQUE
PRESIDENTE

Dr. Julio Cesar DIAZ ZEGARRA
SECRETARIO

Mg. Walter Richard TASAYCO ALCANTARA
VOCAL

Leyenda:
*Resultado: Aprobado o Desaprobado
**Mención según escala de calificación (19 a 20: Excelente); (17 a 18: Muy Bueno); (14 a 16: Bueno)

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA DE PREGRADO

IDENTIFICACIÓN PERSONAL (especificar los datos de los autores de la tesis)

Apellidos y Nombres: Romero Leiva Camilo André

DNI: 77385271 **Correo Electrónico**: andrecamilor@gmail.com

Teléfono Casa: **Celular:** 977995553 **Oficina**: _____

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS

Pregrado
Facultad de Medicina veterinaria y Zootecnia **E.P.: Medicina Veterinaria**

Título Profesional obtenido:

Médico Veterinario

Título de la tesis:

CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL CANINA CON RIESGO ZOONÓTICO EN PERSONAS ADULTAS QUE ASISTEN A UNA CLÍNICA VETERINARIA DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR-LIMA 2021

Tipo de acceso que autoriza(n) el (los) autor (es):

Marcar "X"	Categoría de Acceso	Descripción de Acceso
X	**PÚBLICO**	Es público y accesible al documento a texto completo por cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio.
	RESTRINGIDO	Solo permite el acceso al registro del metadato con información básica más no al texto completo.

Al elegir la opción "Público", a través de la presente autorizo o autorizamos de manera gratuita al Repositorio Institucional – UNHEVAL, a publicar la versión electrónica de esta tesis en el Portal Web repositorio.unheval.edu.pe, por un plazo indefinido, consintiendo que con dicha autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita, pudiendo revisarla, imprimirla o grabarla, siempre y cando se respete la autoría y sea citada correctamente.

En caso haya (n) marcado la opción "Restringido", por favor detallar las razones por las que se eligió este tipo de acceso:

_____
_____
_____

Asimismo, pedimos indicar el período de tiempo en que la tesis tendría el tipo de acceso restringido:

( ) 1 año

( ) 2 años

( ) 3 años

( ) 4 años

Luego del período señalado por usted (es), automáticamente la tesis pasará a ser de acceso público.

Fecha de firma: 20/07/22

Firma del autor y/o autores:

Firma

Huella