

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
FACULTAD DE OBSTETRICIA
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
CARRERA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



**“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS DEL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING
FERRARI HUÁNUCO - AMARILIS 2023”**

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: CIENCIAS DE LA SALUD

SUB-LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

TESISTAS:

Bach. CALDERON ALIAGA, Yadira Benita

Bach. TIMOTEO CORI, Laura Thalia

ASESORA:

Dra. QUIÑONES FLORES, Mitsi Marleni

HUÁNUCO - PERÚ

2023

**“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS DEL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING
FERRARI HUÁNUCO - AMARILIS 2023”**

DEDICATORIA

A Dios:

Dedicamos esta presente tesis, a Dios

Por guiarnos hasta este momento tan importante

de nuestra carrera profesional. sin duda, tu amor

incondicional ha sido el faro para el éxito y la realización.

A mis queridos padres:

A nuestros padres y familiares quienes con esfuerzo y paciencia

nos han permitido llegar a cumplir cada uno de nuestros sueños

sin importar las dificultades que se encuentren en el camino,

brindándonos el apoyo moral en todo este largo proceso.

Yadira y Laura

AGRADECIMIENTO

A Dios por brindarnos la vida y salud, para seguir adelante y poder alcanzar un sueño más

A nuestra Universidad Nacional “Hermilio Valdizán Medrano”, mi centro de estudios, por permitir que nos desarrollemos como profesionales en estos largos años de carrera universitaria.

Asimismo, a la Dra. Mitsi Marleni Quiñones Flores, mi asesora, quien fue la pieza principal en todo el proceso de desarrollo de nuestra investigación, gracias a su conocimiento y capacidad fue posible concluir este trabajo con éxito.

De la misma manera agradecer a mis docentes quienes nos guiaron aportando conocimientos y consejos para que se lleve a cabo este estudio, y en especial a la Dra. Mary Luisa Maque Ponce por su apoyo incondicional en la realización de nuestra tesis.

Finalmente agradezco a todos los profesionales que laboran en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”, en especial a los obstetras que permitieron la ejecución de este trabajo de investigación.

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo conocer los factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco – Amarilis 2023. El estudio fue relacional, no experimental, prospectivo, transversal y descriptivo; la muestra lo conformaron 81 puérperas hospitalizadas, obtenidas mediante el tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple con criterios de inclusión y exclusión. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario. Los resultados hallados demuestran que existen factores institucionales como: información brindada por el personal de obstetricia, distancia de la vivienda al hospital es un factor para no acudir a planificación familiar, disponibilidad de todos los métodos anticonceptivos, y el no saber los horarios de atención en el servicio de planificación familiar; los factores personales como: importancia de usar métodos anticonceptivos después del parto, seguido de mitos y creencias, influencia negativa de la pareja, el no tener conocimientos sobre cómo actúan los métodos anticonceptivos y el presentar algún malestar al usar algún método anticonceptivo que haya provocado que lo dejara de usar; los factores gineco-obstétricos como complicaciones durante o después del parto, tipo de parto y número de hijos influyen al rechazo de métodos anticonceptivos; sin embargo los factores sociodemográficos no muestran relación, excepto el indicador de grado de instrucción. Por lo tanto, se concluye que existen factores institucionales, personales, gineco-obstétricos que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas y en el factor sociodemográfico, el grado de instrucción. por lo que acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.

Palabras clave: *Puérperas, rechazo, métodos anticonceptivos, obstetricia.*

ABSTRACT

The research aimed to understand the factors influencing the rejection of contraceptive methods among postpartum women at the Maternal-Child Hospital Carlos Showing Ferrari in Huánuco - Amarilis 2023. The study was relational, non-experimental, prospective, cross-sectional, and descriptive. The sample consisted of 81 hospitalized postpartum women, selected through non-probabilistic purposive sampling using inclusion and exclusion criteria. The survey technique was employed, and the instrument utilized was a questionnaire. The findings indicate that there are institutional factors such as the information provided by obstetric personnel, distance from home to the hospital as a barrier to seeking family planning, availability of all contraceptive methods, and lack of knowledge about family planning service hours. Personal factors include the importance of using contraceptive methods after childbirth, followed by myths and beliefs, negative partner influence, lack of knowledge about how contraceptive methods work, and experiencing discomfort while using a contraceptive method leading to discontinuation. Gynecological-obstetric factors like complications during or after childbirth, type of delivery, and number of children also influence the rejection of contraceptive methods. However, sociodemographic factors show no significant correlation, except for the level of education indicator. In conclusion, there are institutional, personal, and gynecological-obstetric factors that influence the rejection of contraceptive methods among postpartum women. Among sociodemographic factors, education level plays a significant role. Therefore, the research hypothesis is accepted, and the null hypothesis is rejected.

Keywords: *Postpartum women, rejection, contraceptive methods, obstetrics.*

ÍNDICE

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTO	iv
RESUMEN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ÍNDICE.....	vii
ÍNDICE DE TABLA	ix
INTRODUCCIÓN	xiv
CAPÍTULO I.....	16
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	16
1.1. Fundamento del problema de investigación	16
1.2. Formulación del problema de investigación.....	18
1.3. Formulación de los objetivos	19
1.4. Justificación	20
1.5. Limitaciones:.....	21
1.6. Formulación de Hipótesis	22
1.7. Variables.....	23
1.8. Definición teórica y Operacionalización de variables.....	24
CAPÍTULO II.....	26
MARCO TEÓRICO	26
2.1. Antecedentes.....	26
2.2. Bases Teóricas	35
2.1. Bases Conceptuales.....	49
2.2. Bases Antropológicas	49
CAPÍTULO III.....	51
METODOLOGÍA	51

3.1. Ámbito.....	51
3.2. Población	51
3.3. Muestra.....	51
3.4. Nivel y Tipo de estudio.....	52
3.5. Diseño de investigación	53
3.6. Métodos, técnicas e Instrumentos	54
3.7. Validación y confiabilidad de los instrumentos.....	55
3.8. Procedimientos	57
3.9. Tabulación y análisis de datos.....	58
3.10. Consideraciones éticas	59
CAPÍTULO IV.....	60
RESULTADOS.....	60
CAPÍTULO V.....	88
DISCUSIÓN	88
CONCLUSIONES	91
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS	93
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	94
ANEXOS.....	103

ÍNDICE DE TABLA

Tabla 01. Edad de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	60
Tabla 02. Descripción de los factores sociodemográficos de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	62
Tabla 03. Descripción de los factores institucionales de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	68
Tabla 04. Descripción de los factores personales de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	74
Tabla 05. Descripción de los factores gineco-obstétricos de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	80
Tabla 06. Rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023”.	84
Tabla 07. Factores sociodemográficos, institucionales, personales, gineco-obstétricos que influyen en el rechazo a métodos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	86
Tabla 08. Prueba de Chi cuadrado de los factores sociodemográficos y rechazo a métodos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.....	113
Tabla 09. Prueba de Chi cuadrado de los factores institucionales y rechazo a métodos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	114

Tabla 10. Prueba de Chi cuadrado de los factores personales y rechazo a métodos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	115
Tabla 11. Prueba de Chi cuadrado de los factores gineco-obstétricos y rechazo a métodos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	116

ÍNDICE DE GRÁFICOS

- Figura 01. Descripción grafica de la edad de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023..... 61
- Figura 02. Descripción grafica de la ocupación de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023..... 63
- Figura 03. Descripción grafica del grado de instrucción de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023. 64
- Figura 04. Descripción grafica de la residencia de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023..... 65
- Figura 05. Descripción grafica del estado civil de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023..... 66
- Figura 06. Descripción grafica de la religión de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023..... 67
- Figura 07. Descripción grafica del factor: Recibió información por parte del profesional de obstetricia sobre métodos anticonceptivos después del parto, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023. 69
- Figura 08. Descripción grafica del factor: Considera Ud. que el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari dispone de todos los de métodos anticonceptivos, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023. 70

Figura 09. Descripción grafica del factor: El personal de salud mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	71
Figura 10. Descripción grafica del factor: Considera que la distancia de su vivienda al hospital es un factor para no acudir al consultorio de planificación para recibir su método anticonceptivo, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	72
Figura 11. Descripción grafica del factor: Usted sabe los horarios de atención del servicio de planificación familiar, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.....	73
Figura 12. Descripción grafica del factor: Cree usted que su pareja influye negativamente en el uso de métodos anticonceptivos, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.....	75
Figura 13. Descripción grafica del factor: Usted presento algún malestar al usar algún método anticonceptivo y que haya provocado que lo dejara de usar, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	76
Figura 14. Descripción grafica del factor: Usted tiene conocimiento de cómo actúan los métodos anticonceptivos en su cuerpo, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	77
Figura 15. Descripción grafica del factor: Escuchó algún mito o creencia sobre algún método anticonceptivo, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	78
Figura 16. Descripción grafica del factor: Considera que usar métodos anticonceptivos después del parto es importante, en puérperas	

del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	79
Figura 17. Descripción grafica del tipo de parto de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.....	81
Figura 18. Descripción grafica del número de hijos de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.	82
Figura 19. Descripción grafica de las complicaciones durante y después del parto que le impida utilizar algún Método anticonceptivo las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.....	83
Figura 20. Descripción grafica del rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.....	85

INTRODUCCIÓN

En los últimos años la planificación familiar está teniendo un auge reproductivo de regular la fecundidad en la mujer haciendo que recurran al uso de métodos anticonceptivos, controlando así su reproducción y la descendencia. Después del parto muchas mujeres consideran el uso o rechazo de un anticonceptivo, este último puede deberse a factores personales, institucionales, gineco-obstétricos o culturales. Por lo que, el estudio se desarrolló con el objetivo de conocer los factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en púerperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023. La hipótesis de investigación fue que, los factores sociodemográficos, institucionales, personales y gineco-obstétricos influyen al rechazo de métodos anticonceptivos en púerperas. Para un mejor entendimiento del estudio se separa por capítulos donde:

En el capítulo uno, se establece la fundamentación del problema de investigación, asimismo se encuentra la formulación del problema, objetivos, justificación y las limitaciones del estudio, así como la formulación de hipótesis. También se tiene en cuenta las variables dependiente e independiente de la investigación, por último, se realiza la definición de términos operacionales y la operacionalización de las variables.

En el Capítulo dos, se aborda el marco teórico donde se expone los antecedentes internacionales, nacionales y locales. A continuación, se presentan las bases teóricas, conceptuales y antropológicas que fueron usados y explicados minuciosamente para fundamentar el desarrollo de la investigación.

En el capítulo tres, se describe el marco metodológico, donde se expone el ámbito, población y la muestra del estudio, seguido encontraremos el nivel y tipo de estudio realizado. Además, se presenta el diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos usados para la recolección de datos, así como la validación y confiabilidad del instrumento; por último, se detallan los procedimientos, la tabulación y el análisis realizado.

En el capítulo cuatro, se presentan los resultados obtenidos a través de la investigación, teniendo en cuenta el análisis descriptivo, inferencial, así como la contrastación de hipótesis generales y específicas.

En el capítulo cinco se exponen la discusión de los resultados y se resalta el aporte que el estudio proporciona a la investigación, seguido se encuentra las conclusiones y recomendaciones, Además, se presenta la bibliografía usada. Finalmente, se adjuntan los anexos que fueron empleados a lo largo de todo el proceso de investigación.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Fundamento del problema de investigación

La planificación familiar posparto (PFPP) cumple un papel importante en las estrategias para reducir la necesidad insatisfecha de planificación familiar, que se define como la prevención de embarazos no planificados y de intervalos intergenésicos cortos durante los primeros 12 meses después del parto. Las mujeres en el periodo de puerperio tienen la mayor demanda insatisfecha en anticoncepción después de un parto, sin embargo, no reciben los servicios adecuados para reducir los embarazos no planificados y sus consecuencias. Un informe evaluado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014, que analizó datos de encuestas demográficas y de salud en 27 países, encontró que el 95 % de las mujeres de 0 a 12 meses después del parto quieren evitar el embarazo durante los próximos 24 meses, sin embargo, el 70 % de puérperas no usan anticonceptivos (1).

Mientras el país invierte en la compra de métodos anticonceptivos y que según la Norma técnica de salud de Planificación Familiar también incluyen acciones en la anticoncepción posparto, no se hallan datos específicos y exclusivos del porcentaje en anticoncepción en la población puérpera, sin embargo podemos mencionar que en el Perú según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2021, el 57% de las mujeres convivientes o casadas utilizan algún método anticonceptivo moderno, con los porcentajes más bajos en dichas regiones, que conforman la mitad del país: Puno 37.7%, Huancavelica 41.4%, Huánuco 50.2%, Tacna 46.2%, Ancash 48.6%, Loreto 49.9%, Amazonas 51%, Cajamarca 52. %, Cusco 53.9%, Ayacucho 55,8%,

Lambayeque 53,8%, San Martín 55,5%, Apurímac 56%, Provincia de Lima 56,3%. Este uso fue mayor entre las mujeres casadas con menor nivel educativo (38,8 % sin educación y 48,4 % entre las mujeres con solo educación primaria), y también es menor entre las mujeres del quintil más pobre (49,1 %) (2). Por otro lado, la abstinencia posparto duró en promedio 4 meses, pero la mitad de las madres retomaron su vida sexual al mes, y el período de insusceptibilidad postparto por el nacimiento del hijo anterior duró en promedio 8 meses. Asimismo, el 10% del 32,6% de la población está esperando otro hijo antes de los 2 años (3).

Según la ENDES 2020 en la provincia de Huánuco, el 50,2% de las mujeres casadas o convivientes utilizaba algún método anticonceptivo al momento de la entrevista. Un total de 37,3% quiere un hijo, aunque la mayoría quiere esperar dos años o más (28%), mientras que el 9,3% quiere pronto, es decir. quieren otra hija antes de los dos años o un hijo (4).

La decisión de rechazar cualquier método anticonceptivo durante la etapa del post parto no puede atribuirse únicamente a la falta de información y conocimiento de la existencia de dichos métodos, ya que la política estatal es promoverlos y distribuirlos gratuitamente. Por tanto, podemos considerar factores más complejos como factores sociodemográficos relacionados con mitos, creencias y tabúes arraigados en la población, el machismo, la influencia de ciertas religiones y factores institucionales, que en cierta medida están relacionados con factores actitudinales, personales y de acceso limitado. a los servicios de planificación familiar (5).

Es claro que el embarazo no planeado e inadecuado es un problema de salud pública porque se asocia con aumento de la morbilidad materna, infantil y neonatal, tales como: parto prematuro, restricción del crecimiento intrauterino, desprendimiento prematuro de placenta y rotura uterina. El aborto espontáneo y los abortos inducidos también son el resultado de un embarazo no deseado, lo que lleva a la muerte materna

y perinatal. Para evitar que esto suceda, la Organización Mundial de la Salud recomienda esperar al menos 24 meses después de un nacimiento vivo antes de intentar quedar embarazada. (6); Sin embargo, existen factores (como los mencionados anteriormente) asociados al rechazo de la anticoncepción postparto basados en evidencia científica, por lo cual es de interés conocer cuáles son y cómo se presentan estos factores en las puérperas y mejorar las estrategias de la Planificación familiar postparto, incluyendo también al grupo de mujeres que luego de una orientación y consejería en el puerperio accedieron a un método anticonceptivo (generalmente preservativo) sin la certeza de que lo usen o no de acuerdo a la condición frente al inicio de las relaciones sexuales. Finalmente conociendo aquellos factores que condicionan la probabilidad de rechazo nos permitirá contribuir al control de la tasa de natalidad en nuestra población creando así a largo plazo más acceso a la educación, alimentación, vestimenta y servicios básicos en cada uno de los hogares. Por ello planteamos una interrogante de investigación que busca conocer los factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos posparto en mujeres puérperas del Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari”.

1.2. Formulación del problema de investigación

Problema general

¿Cuáles son los factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco – Amarilis 2023?

Problemas específicos

- ✓ ¿Cuáles son los factores sociodemográficos que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023?

- ✓ ¿Cuáles son los factores institucionales que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023?
- ✓ ¿Cuáles son los factores personales que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023?
- ✓ ¿Cuáles son los factores Gineco-Obstétricos que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023?

1.3. Formulación de los objetivos

Objetivo general

Conocer los factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.

Objetivos específicos

- ✓ Identificar los factores sociodemográficos que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco – Amarilis 2023.
- ✓ Indicar los factores institucionales que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.
- ✓ Especificar los factores personales que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco – Amarilis 2023.
- ✓ Determinar los factores Gineco-Obstétricos que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital

1.4. Justificación

La investigación se justifica por las siguientes razones:

Por su relevancia practica

Debido a que se halló que existen factores institucionales, personales y gineco-obstétricos, siendo estos significativos (p valor < 0.05) por lo que se asocian al rechazo de los métodos anticonceptivos, con estos resultados permitirán que el profesional de obstetricia pueda ofrecer un mejor escenario preventivo desde diversos planos, además de que será una opción que promoverá una mejora en la promoción de los métodos anticonceptivos a nivel institucional; así con los resultados obtenidos se solucionará los problemas enfocados en el rechazo de las puérperas hacia los métodos anticonceptivos, pues se conocieron los factores que influyen al rechazo, en los cuales el personal de obstetricia enfocará actividades de mejora y sensibilización.

Por su relevancia social

La planificación familiar es un componente importante para el desarrollo social y económico de los países en desarrollo, también lo es para la puérpera que se beneficiará con las acciones que deriven de una implementación de estrategias buscando atenuar sus dudas orientándola correctamente para espaciar o limitar un embarazo.

Por su relevancia teórica

El aporte teórico dará una visión más amplia de la situación actual en relación a los factores influyentes al rechazo a los métodos anticonceptivos, poder abordar y cubrir mediante estrategias efectivas las necesidades insatisfechas para la promoción de la planificación después del parto.

Por su relevancia metodológica

Metodológicamente esta investigación se justifica porque es un estudio de carácter correlacional, porque se utilizó un instrumento de elaboración propia. Además, la información encontrada en los resultados servirá como base para investigaciones futuras.

1.5. Limitaciones:

- El estudio tuvo como limitación la poca participación de las puérperas en las encuestas para la recolección de datos. sin embargo, no afectó a la generalización de los hallazgos y la comprensión completa del fenómeno estudiado.

1.6. Formulación de Hipótesis

Hipótesis general

Hi: Los factores sociodemográficos, institucionales, personales y gineco-obstétricos influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.

Ho: Los factores sociodemográficos, institucionales, personales y gineco-obstétricos no influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en mujeres puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.

Hipótesis específicas:

Ha₁: Los factores sociodemográficos influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.

Ho₁: Los factores sociodemográficos no influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.

Ha₂: Los factores institucionales influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.

Ho₂: Los factores institucionales no influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.

Ha₃: Los factores personales influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco – Amarilis 2023.

Ho₃: Los factores personales no influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.

Ha4: Los factores Gineco-Obstétricos influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.

Ho4: Los factores Gineco-Obstétricos no influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.

1.7. Variables

Variable independiente

Factores

Indicadores

- Factores sociodemográficos
- Factores institucionales
- Factores personales
- Factores gineco- obstétricos

Variable dependiente

Rechazo a métodos anticonceptivos

1.8. Definición teórica y Operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	VALOR DEL INDICADOR	ÍTEM	ESCALA DE MEDICIÓN
Variable Independiente Factores	Son aquellos elementos que intervienen, determinan o influyen en la conducta, desarrollando situaciones de manera negativa o positiva, los que pueden ser de origen internos, externos, voluntarios o involuntarios (7).	Factores Sociodemográficos	Edad	<18 18-23 24-29 30-35 >35	Ítem 01	Intervalo
			Ocupación	Ama de casa Estudiante trabajo independiente Empleado	Ítem 02	Nominal
			Grado de instrucción	sin instrucción Primaria Secundaria Superior	Ítem 03	Nominal
			Estado civil	Soltera conviviente casada	Ítem 04	Nominal
			Religión	Católico Evangélico Otros	Ítem 05	Nominal
			Procedencia	Urbano Rural	Ítem 06	Nominal
		Factores Institucionales	Consejería oportuna y efectiva en MAC	Si/no	Ítem 07	Nominal
			Disponibilidad de métodos anticonceptivos	Si/no	Ítem 08	Nominal

			Trato del obstetra en la atención	Si/no	Ítem 09	Nominal	
			Distancia entre su vivienda y el hospital	Si/no	Ítem 10	Nominal	
			Horario de atención	Si/no	Ítem 11	Nominal	
		Factores Personales		Influencia negativa de la pareja hacia MAC	Si/no	Ítem 12	Nominal
				Efectos adversos al uso de MAC	Si/no	Ítem 13	Nominal
				Conocimientos previos de MAC	Si/no	Ítem 14	Nominal
				Mitos y creencias populares	Si/no	Ítem 15	Nominal
				Planificación familiar postparto	Si/no	Ítem 16	Nominal
		Factores Gineco-obstétricos		Tipo de parto	Vaginal/cesárea	Ítem 17	Nominal
				Paridad	Primípara Multípara Gran multípara	Ítem 18	Nominal
				Complicaciones en el Trabajo de parto	Si/no	Ítem 19	Nominal
		Variable Dependiente Rechazo a MAC	Se define como la manifestación negativa hacia la aceptación de alguna opción, ya sea natural como artificial, con el propósito de prevenir un embarazo no planificado (8).	Rechazo a uso de método anticonceptivo	Rechazo a uso de método anticonceptivo	Si/ No	Ítem 20

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Antecedentes Internacionales

Vázquez R., Et al. (México, 2022). Desarrollaron su investigación “Factores que motivan a las mujeres en puerperio inmediato a rechazar los métodos anticonceptivos en un Hospital de Veracruz”. El diseño empleado fue de enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal. Investigaron a de 45 mujeres en puerperio inmediato. Los resultados que obtuvieron fue que el 40 % de puérperas mencionaron el miedo a los efectos secundarios como la razón principal para rechazar un anticonceptivo, mientras que el 15,6% respondieron que el rechazo fue por motivo de desconfianza. Por otro lado, un 8,9% de ellas manifestaron que fue por mitos y rumores, y otro 8,9% afirmó que la falta de conocimiento era razón para rechazarlos. Además, el 6,7% de las puérperas mencionaron que se debía a la falta de aprobación de la pareja. El informe concluye que las mujeres con estudio desconocen varios aspectos sobre métodos anticonceptivos teniendo como principal motivo de rechazo el temor a los efectos secundarios (9)

Analuisa E. y Huilcapi AO. (Ecuador, 2022). Desarrollaron su investigación titulada “Uso de anticoncepción en mujeres de la zona rural indígena”. La metodología fue cuantitativa, observacional descriptivo de corte transversal y de campo. estuvo conformada por 100 mujeres. Los resultados revelaron que el grupo de edad estaba entre 36 y 45 años. En cuanto al estudio la mayoría manifestó tener un nivel académico primario (51%). En cuanto al conocimiento de métodos anticonceptivos 56% del conocimiento fue desinformado y el 46%

fueron informados por profesional de salud. El 39% de la población dijo no usar un método anticonceptivo, a diferencia del 24 % que si usan prefiriendo a los inyectables. El 23% manifestó que no opto por un método anticonceptivo debido a que no era de interés en ese momento, mientras que el 16 % dijo que no utilizó debido a que tenían poca disponibilidad de tiempo. Se concluyó que una cantidad de mujeres no usa ningún método anticonceptivo y también tienen una baja tasa de aceptación de condones, DIU y esterilizaciones en comparación con los métodos hormonales (10)

Romo G., García GM., Huerta LF y Ponce AL. (Ecuador, 2021). Realizaron su investigación titulada “Factores que influyen en la aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos en el puerperio”. Su estudio fue de naturaleza descriptiva, observacional y transversal. La muestra fue 1,010 puérperas inmediatas. Los resultados respecto a la aceptación o rechazo de un método anticonceptivo revelaron que la edad de la paciente ($P < 0.05$), estado civil ($P < 0.001$), número de hijos ($P < 0.001$), partos anteriores ($p < 0,001$). 0,01), número de cesáreas ($P < 0,001$) y uso previo de anticonceptivos ($P < 0,001$). Tuvieron una influencia significativa. Entre los anticonceptivos más elegidos se encontraba el dispositivo intrauterino (67,85%) y la anticoncepción quirúrgica voluntaria (28,20%). El principal motivo de rechazo a un método anticonceptivo fue causas atribuidas por el marido (33,6%) y el aplazamiento del uso de anticonceptivos hasta después del puerperio (32,0%). Concluyeron que existe influencia de la pareja ante el uso de anticonceptivos, es necesario promover métodos anticonceptivos individualizados involucrando sistemáticamente a la pareja en la atención en planificación familiar, convencerlo de los beneficios de varios métodos y así aumentar la elección de anticonceptivos después del parto (11).

Macayo E. (España, 2021). En su estudio “Uso de métodos anticonceptivos durante el puerperio en el área sanitaria de Oviedo”. El diseño de la investigación fue de tipo cuantitativo, transversal, analítico. La muestra incluyó 164 puérperas. Se encontraron los siguientes resultados: El 44% de las mujeres no utilizaron un método anticonceptivo debido a que no mantuvieron relaciones sexuales, mientras que 12% fue porque piensa que puede afectar la lactancia materna. El 72% de las puérperas recibieron información de

métodos anticonceptivos por una matrona y el 19% fue por un ginecólogo. El anticonceptivo más elegido fue el preservativo (56,7%) y sólo el 7,3% optó por anticonceptivos reversibles de larga duración. Se concluyó que la elección del método anticonceptivo depende mayormente de la información recibida durante el puerperio en el cual las parteras instruyeron con mayor frecuencia en el uso de métodos anticonceptivos (12).

Cano L. y López A. (México, 2020) en su investigación titulada “Rechazo de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil en Vicente Guerrero, Tabasco”. Fue un estudio descriptivo, de corte transversal, prospectivo y observacional. La muestra fueron 87 residentes. Encontraron los siguientes resultados: La edad de los encuestados en promedio era de 26 años, con grado de instrucción máximo el nivel secundario (45%). En cuanto a los factores de rechazo, el 28,7% manifestaron que el motivo principal fue el miedo a los efectos secundarios, seguido por mitos y rumores (21.8%) y la falta de conocimiento sobre los métodos (19,5%). Concluyeron que la causa más frecuente de rechazo se debe a la desinformación, principalmente en mujeres con mayor nivel académico, reportando a este grupo de estudio con el mayor índice de necesidades insatisfechas en anticoncepción. (13).

Cocom NM. (Guatemala, 2020). En su investigación “Factores culturales que influyen en la aceptación de métodos de planificación familiar Cantón Pachipac, Nahualá Sololá”. El estudio fue cualitativo etnográfico. Los resultados que encontró: En el 100% de las mujeres en estudio predomina solo el idioma Kiché, las edades fueron entre 28 y 48 años. De las entrevistadas son casadas 93%, religión evangélica 67%, 10 hijos o más 40%, analfabeta 53%, ocupación bordada a mano 60% y tipo de familia nuclear el 66%. Respecto a los factores culturales predomina el tabú en la cual mencionan que producen enfermedades, que los esposos son abusivos y no se habla de eso; en lo social el esposo manda; y en lo religioso es pecado utilizar. Concluyó que existen factores culturales relacionados a la no aceptación de métodos de planificación familiar los cuales son: Tabús, nivel de estudios, desinformación, factores religiosos y prejuicios lo que condicionan el crecimiento rápido de la demografía, además de no ser atendidas por el idioma local Kiché (14).

Zaldívar AK., Fernández MÁ., Ponce ER. y Dávila R. (México, 2020). Ejecutaron su estudio titulado “Factores que influyen en el uso de métodos anticonceptivos post evento obstétrico”. La metodología fue descriptiva, observacional y transversal. Su muestra lo conformaron 136 puérperas. Los resultados mostraron que el 9,7 %, recibieron consejería en métodos anticonceptivos, de ellas, solo el 85,2% utilizó algún anticonceptivo, mientras que el 57,1% que no la recibieron, también lo usaron. De las que recibieron asesoramiento, el 89,7 %, lo recibió en el centro de salud. El 65,6 % de 83,8 % de mujeres con pareja refirió que la influencia de su pareja fue decisiva para usar un anticonceptivo. Asimismo, el 46,3% reiniciaron su actividad sexual después del parto a los 58 días. En cuanto al uso de métodos anticonceptivos más frecuentes destacaron el DIU (29,4%), implante subdérmico (20,5%) y condón (15,1%). Concluyeron que existen factores que inciden al uso de un anticonceptivo las cuales están directamente relacionados con el éxito o fracaso de la consejería en planificación familiar (15).

Antecedentes Nacionales

Ramírez JD. (Cuzco, 2022) realizó su investigación “Factores que Influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Hospital Regional del Cusco”. Diseño no experimental de enfoque cuantitativo y transversal. Se investigó a 251 puérperas. Los resultados encontrados fueron que 121 puérperas aceptan el método anticonceptivo, donde 19.5%, lo hacen porque no desean tener más hijos. Seguido por 12.7%, que acceden porque desean alargar el periodo intergenésico y el 4.0% lo hizo por complacer a su pareja. Los anticonceptivos más utilizados fueron: inyectable (13.5%), implante (11.2%), preservativo (10.8%), bloqueo tubárico (4.8%) y el dispositivo intrauterino con el 4.0%. Por otro lado, las mujeres que no aceptó un método anticonceptivo lo hizo debido a efectos adversas en un 21.5% de los casos, mientras que el 10.4% indicó que fue por su propia decisión, finalmente; la condición religiosa representó el (4.4%). El estudio concluye que los factores personales, gineco-obstétrico y sociocultural influyen en la elección de métodos anticonceptivos (16).

Sánchez SD. (Lima, 2022) realizó su tesis titulada “Conocimiento y elección de métodos anticonceptivos posparto en puérperas mediatas del Centro de Salud Túpac Amaru, agosto – setiembre 2022”. Su estudio fue de enfoque cuantitativo, transversal, descriptivo correlacional. La muestra fueron 92 puérperas. Los resultados hallados fueron: El nivel de conocimiento medio fue de 59.8%, nivel bajo (28.2%), y nivel alto (12%). En cuanto al uso de algún método anticonceptivo, el 78.3% las utilizó, de ellas el 51,1% eran de nivel de conocimiento alto, Mientras que el 21,7% no las utilizó y tenían un nivel de conocimiento bajo de 10.9% en el periodo de postparto. Finalmente, el estudio concluye que, el mayor conocimiento sobre los métodos anticonceptivos que pueden usar en el posparto se asocia con la elección de estos (17).

Reyes, M. (Cañete, 2021). En su estudio “Factores que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Hospital Rezola”. El diseño del estudio fue correlacional, no experimental y transversal, conformada por 123 puérperas. Los resultados evidenciaron que el 87% aceptó un método anticonceptivo y el 13% no aceptó usarlos. Respecto a factores personales, se observó que el 72.4% de las puérperas con estudios técnicos o superiores aceptaron utilizar métodos anticonceptivos. En cuanto al factor gineco - obstétrico el 50,4% tuvieron todos sus partos por vía vaginales, asociándose a la aceptación de anticonceptivo. por último, en el factor sociocultural, consideran que no es necesario cuidarse después de dar a luz por dos años, esto representó el 77,2% El estudio concluyó que los factores que se asocian en la aceptación de métodos anticonceptivos son diversos y se encuentran tanto las dimensiones personales, gineco- obstétrico y sociocultural (18).

Gadea, M. (Lima, 2021). Ejecutó un estudio titulado “Factores asociados al rechazo de uso de métodos anticonceptivos después del parto en el Hospital de apoyo María Auxiliadora”. La metodología usada fue observacional, analítica y transversal. Conto con la participación de 251 pacientes. En los resultados obtuvo que el 16,7% rechazó el uso de métodos anticonceptivos modernos. La mayoría de estas mujeres se encontraban en el grupo de 20 y 34 años (73,3%), con educación secundaria (70,9%), Vivian en parejas (81,7%) y tenían empleo (71,3%). Las experiencias negativas relacionadas

con el uso de MAC (RP=8,44; p=0,000) y la actitud negativa de la pareja hacia el uso de MAC (RP=5,17; p=0,001) fueron factores asociados con el rechazo de estos métodos. Además, se observó que la primiparidad también fue un factor asociado. (RP=0,43; p=0,017). Concluyó que, los factores que motivan a rechazar métodos anticonceptivos modernos en púerperas son principalmente personales, culturales y obstétricos (19).

Alvarado PF. (Cajamarca, 2020) desarrolló un estudio titulado “Factores sociales asociados a la no elección de métodos anticonceptivos en púerperas adolescentes atendidas en el Hospital II- E Simón Bolívar”. Su diseño fue no experimental, transversal, descriptivo y correlacional. conformada por 105 mujeres en puerperio. Los resultados mostraron que el 81,90% se encuentran en la edad de 16-17 años. De estas el 25,7% son de zona rural y no eligieron un método anticonceptivo, a diferencia del 14,29% que pertenecen a la zona urbana. En tanto, en el nivel de instrucción, se encontró que el 27.71% de las mujeres que no habían decidido utilizar un método anticonceptivo tenían educación secundaria, mientras que el 3.81% no tenían grado de instrucción. Respecto al estado civil, el 25.71% de las convivientes no habían utilizado un método anticonceptivo, lo cual representó un porcentaje mayor que el 9.52% de las mujeres solteras. En términos de los factores sociales que mantuvieron una mayor correlación con la falta de elección de un método anticonceptivo, se encontró que la actitud de pareja fue el único factor que mostro una correlación significativa con un (p valor de =0,000). Finalmente concluyó que no existe asociación entre los factores sociales y la no elección de métodos anticonceptivos entre las púerperas jóvenes (20).

Mejía M. y Pineda R. (Huaraz, 2019). Realizaron un estudio titulado “Factores asociados al no uso de métodos anticonceptivos durante el puerperio, Hospital Víctor Ramos Guardia”. El diseño fue no experimental, descriptivo, correlacional, prospectivo. Los resultados encontrados fueron que el 95,8% tuvieron de 20 a 45 años, el 36,8% completó estudios secundarios, el 75,2% fueron de religión católica. En cuanto a la no uso de anticonceptivos, un 51,2% afirmaron que fue debido a la negativa del esposo, el 48,7% considera que el comentario negativo de amigos si influye. En relación al factor personal el idioma quechua represento el 29,9% de las cuales el 23,1% no usan un

método anticonceptivo. El 59% no tiene alguna enfermedad que le impida usar un anticonceptivo, de ellos el 55,6% no usará anticonceptivo durante el puerperio. Concluyeron que los factores sociales no muestran asociación con el no uso de métodos anticonceptivos, sin embargo, los factores culturales y personales muestran ciertos indicadores como el idioma y las actitudes e influencias negativas del entorno influyen significativamente en el no uso de los métodos anticonceptivos durante el puerperio con excepción de la religión y los mitos y creencias (21).

Roncero LN. (Ica, 2019). Llevó a cabo una investigación titulada “Factores que influyen en la aceptación del uso de métodos anticonceptivos en las puérperas del Hospital San José de Chíncha”. El estudio se llevó a cabo utilizando un enfoque cuantitativo, transversal prospectivo, no experimental. La muestra consistió en 186 puérperas. Los resultados demostraron que, dentro de los factores cognitivos, se encontraron que el 46.6% de las participantes presentaban un nivel de conocimiento bajo y rechazaban el uso de anticonceptivos, mientras que el 47,1% tiene un nivel de conocimiento regular y aceptaban su uso. Entre las puérperas que no aceptaron un método anticonceptivo, el 40.1% manifestó tener creencias desfavorables y el 12,2% expresaron el deseo de cuidarse con métodos naturales. Por último, observaron que el 93.6% de las puérperas contaban con la aceptación de sus esposos para utilizar anticonceptivos. Concluyó que los factores familiares y cognitivos si influyen en la aceptación del uso de MAC, mientras que los factores sociodemográficos no influyen en la aceptación del uso de MAC durante el puerperio (22).

Antecedentes Locales

Gómez C. y Llallico YN. (Huánuco, 2022). Realizaron su tesis titulada “Relación entre el nivel de conocimiento y la actitud que tienen las puérperas sobre los métodos anticonceptivos en el Centro de Salud Las Moras”. El diseño se enmarcó en un nivel descriptivo relacional y adoptó un enfoque cuantitativo, no experimental y prospectivo. Los resultados mostraron que las puérperas presentaban un nivel de conocimiento medio y actitudes regulares en un 48.2% de los casos. Además, se observó que un 20.0% de las

participantes mostraba un nivel alto de conocimiento y buenas actitudes. Por otro lado, ninguna puérpera con un nivel alto de conocimiento presentaba actitudes deficientes, lo que indica que poseían un conocimiento medio sobre las generalidades, modos de uso y tipos de métodos anticonceptivos. El análisis de los conocimientos y las actitudes mostró una correlación estadísticamente significativa ($Rho = 0,873$ y $p = 0,000$). Concluyeron que Existe una correlación entre el nivel de conocimientos y actitudes hacia los métodos anticonceptivos (23).

Hernández M. y Huamani JV. (Huánuco, 2022). Desarrolló su tesis “Factores sociodemográficos y familiares en la elección del método anticonceptivo de corta duración en puérperas atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha”. El estudio fue de tipo observacional, transversal y prospectivo. Los resultados mostraron que los factores influyentes fueron: entre los factores demográficos, la edad adulta (78%); entre los factores obstétricos el 39% fueron multigestas y el 54% tuvieron periodo intergenésico patológico; entre los factores sociales, provenientes de zona urbana el 52% , y el tener estudios secundarios a más, un 86%; entre los factores culturales, ser creyentes de una religión (64%), disminución de la leche materna en la lactancia (26%), disminución del deseo sexual (30%); y, como factores familiares: embarazo no deseado (52%); y la decisión del familiar en temas de salud de la mujer (54%). Conclusión: Los factores sociodemográficos y familiares más de una vez influyen significativamente en la elección de métodos anticonceptivos de corta duración entre las puérperas. (24)

Zambrano J. (Huánuco, 2021). Realizó su estudio” Factores y actitudes frente al Rechazo del Dispositivo intrauterino en pacientes del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano”. La metodología fue observacional, prospectivo, transversal y descriptiva. En los resultados observó que la edad era en promedio de 15 a 45 años. El estado civil más prevalente fue el de conviviente, representando el 46,4 %, la ocupación con más predominio fue el de trabajador independiente (37,3 %). En cuanto al nivel de escolaridad, el 48,8% eran de nivel secundaria. Además, la religión católica fue la más común, siendo el (62,4%). La identificación de mitos, creencias y miedos relacionados al rechazo del uso del dispositivo uterino como factores culturales existentes

mostró que el 50,2% de ellos eran factores negativos que respaldaban la existencia del mito propuesto. En cuanto a la actitud de los pacientes hacia el rechazo del dispositivo intrauterino, el 52,5% expresó una actitud positiva y un 47,5% actitud negativa. Conclusión Existen factores y actitudes detrás de la negativa a usar un dispositivo intrauterino. (25).

Rivera L. y Domínguez I. (Huánuco, 2020). En su estudio “Nivel de conocimiento, actitud y práctica y su vínculo con el mal uso de métodos anticonceptivos en puérperas en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari”. Fue un estudio cuantitativo, observacional, analítico, correlacional y transversal. Encontraron los siguientes hallazgos: El nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos en su gran mayoría presentaron conocimientos regulares (46.1%) y solo el 10.2% tenían conocimientos deficientes. En cuanto a la actitud hacia el uso de anticonceptivos, el 96,3% mostro una actitud positiva, mientras que el 3,7% presentaron una inadecuada actitud. Respecto a la práctica se observó que el 80,4% de las encuestadas tenían práctica adecuada y sólo el 19,6% tenían práctica inadecuada. Concluyeron que, si el nivel de conocimiento es bajo, aumenta el mal uso de anticonceptivos. Y si las actitudes hacia el uso son altas, se reduce la probabilidad de un mal uso. En cuanto al nivel práctico, se observó una práctica adecuada para la mayoría (26).

Garay, M; Rojas, G. (Huánuco, 2019). En su estudio “Factores predisponentes a la no aceptación del bloqueo tubárico bilateral”. Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. fue un estudio de tipo básico, descriptivo y correlacional. Encontraron los siguientes resultados: el 27.7%, de la muestra que se estudió tenían el nivel de educación primaria, 30.4% tenían educación secundaria, el 27.7% superior, y el 14.1% sin estudios, asimismo; el 54% eran convivientes, el 34% estaban casadas y el 12% eran solteras, finalmente; el 53.9% fueron de procedencia urbana, el 36.1% rural y el 10% periurbano. Concluyeron que los factores sociales (43%), los factores culturales (36%); los factores económicos (54%) y los factores psicológicos (55%) son predisponentes que conllevan a la no elección del bloqueo tubárico bilateral de mujeres en estudio. (27)

Leiva AV. (Huánuco, 2019), Realizó su estudio “Funcionalidad familiar y aceptación de métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Hermilio Valdizán Medrano”. su estudio fue observacional, prospectivo, transversal y analítico. El resultado que encontró fue que el 50,8% tuvieron entre 16 a 25 años con predominio entre el grupo de edades, el 69,2% en su mayoría eran convivientes con nivel instructivo secundario (55.0%) de procedencia en zona rural (56,9%). Por otro lado, el 92,3% en estudio tuvieron una actitud de aceptación hacia los métodos anticonceptivos. En cuanto a la funcionalidad familiar, El 55,8% tuvieron Apgar familiar buena, mientras que el 47,3% de las relaciones intrafamiliares se encontraban moderadamente funcional, y el 62,7% fueron parejas funcionales en el subsistema conyugal. El estudio concluyó que, la funcionalidad familiar, relaciones intrafamiliares y el subsistema conyugal se relaciona significativamente con aceptación de anticonceptivos (28)

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Factores

Definición: los factores se definen como los elementos que conllevan a una situación, causante del desarrollo de los acontecimientos. los factores juegan un rol determinante en un resultado, contribuyendo a la obtención de resultados específicos al asumir la responsabilidad de la variación o los cambios. Además, es una característica perteneciente a la persona tal como la edad, el sexo, la identidad sociocultural, los sistemas orgánicos, las aptitudes, etc. (5)

Factores que influyen en el rechazo

Los factores que contribuyen al rechazo a métodos anticonceptivos en el puerperio son aquellas circunstancias que afectan el comportamiento, y están relacionadas con la toma de decisiones respecto a la aceptación ante el uso de un anticonceptivo. A pesar de la alta disponibilidad de métodos anticonceptivos gratuitos en todos los centros de salud y hospitales, existe aún un porcentaje de rechazo por parte de la población puérpera, lo cual puede originarse debido a múltiples factores capaces de influenciar en la

decisión al momento de elegir un método anticonceptivo, lo cual serán clasificados de la siguiente manera (19):

Factores Sociodemográficos:

El concepto sociodemográfico hace referencia a los fenómenos sociales y culturales de una sociedad. Los aspectos socioculturales se relacionan con las tradiciones y el modo de vida. Estos aspectos son los que, en ocasiones, distinguen a una sociedad de otra. Los rasgos socioculturales representan y delimitan la forma en que una sociedad se organiza, Al mismo tiempo que definen su identidad. Las características sociodemográficas son las que principalmente diferencian a las comunidades unas de otras. De igual manera lo sociocultural se refiere al desarrollo de las construcciones de realidad realizadas por el ser humano. Esto surge a partir de las relaciones que se dan entre las personas, dando lugar a patrones de convivencia, con ellos surgen también reglas y tradiciones sociales, así como expresiones y manifestaciones culturales (29)

Se entiende por factores sociodemográficos al conjunto de valores, rasgos, creencias, tradiciones alimenticias, costumbres que distinguen e identifican a una persona. En el presente estudio, se distinguen cuatro dimensiones que son las experiencias laborales, las experiencias vitales, la religión, así como las costumbres (30).

De otro lado las características sociodemográficas hacen referencia a las características que brindan información para conocer a una población, en este caso a la población de pacientes puérperas. se consideran a variables como la edad, ocupación, nivel educativo, estado civil, religión y procedencia. Estas características, tanto en conjunto como en forma individual pueden influir tanto en el rechazo como en la elección del método anticonceptivo. Estos posibles factores asociados son descritos con mayor detalle a continuación (8)

a) Edad

La edad materna es un factor identificado por diversos estudios donde las puérperas que rechazan los métodos de planificación familiar se caracterizan

por ser de edad joven, siendo así la edad un factor que influye en mujeres posparto a la decisión de rechazar usar alguna metodología anticonceptiva moderna. Esta influencia podría estar relacionado con las experiencias vividas y los embarazos anteriores, lo cual explicaría por qué la edad de la madre está estrechamente ligada a la decisión de rechazar o aceptar los métodos anticonceptivos modernos. El estudio de Tello indica que, a mayor edad, específicamente entre los 30 a 39 años, hay una asociación significativa para una mayor aceptación del implaron como método anticonceptivo durante el puerperio (31).

b) Ocupación

Se define como el tipo de trabajo que una persona desempeña, haciendo referencia al puesto específico que ocupa. En cuanto al rechazo de anticonceptivos postparto, estudios recientes afirman que la situación laboral no tiene correlación con el rechazo a los métodos anticonceptivos. Sin embargo, en otros estudios se reconoce que la situación laboral de la paciente si está relacionada con la decisión de aceptar o rechaza el uso de métodos anticonceptivos (32).

c) Grado de Instrucción

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos (33). El nivel de instrucción es un factor que se menciona en diversos estudios donde se observa que las mujeres que rechazan los métodos de planificación familiar tienden a tener un nivel educativo incompleto, por lo tanto, afirman que el nivel educativo es un factor que influye a rechazar algún anticonceptivo en la etapa de postparto. Es de esperarse que una baja instrucción condicione un menor nivel de conocimientos anticonceptivos y mediante esto predisponga un rechazo de los métodos anticonceptivos, esta se relacionaría con la menor capacidad de las mujeres para comprender los mecanismos de acción de los métodos anticonceptivos y creer con mayor facilidad los mitos que existen en torno a su uso (8).

d) Estado civil

Son las condiciones legales y jurídicas que determinan la situación de una persona. El estado civil puede cambiar a lo largo de la vida y en la mayoría de países se requiere obligatoriamente el registro de eventos que originen la modificación del estado civil de una persona. Se ha visto que el conviviente influye a una pareja en decidir usar un método anticonceptivo para planificar su futuro. En un estudio realizado por Parra S. según el estado civil el grupo con mayor aceptación son las solteras 24,7% y el grupo de mayor porcentaje de no aceptación los métodos anticonceptivos son las casadas con 30,6%, mostrando así que el estado civil de la puérpera ejerce influencia sobre la decisión de uso de métodos anticonceptivos (34).

e) Religión

La religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto (35).

La expectativa impuesta a la mujer es de ser esposa y que se dediquen al cuidado del hogar y de la familia. Se resalta a la maternidad y se prohíbe el uso de anticonceptivos "antinaturales", limitándose a aceptar únicamente métodos naturales, a pesar de ser considerados los menos seguros. Como resultado de esto las mujeres salen embarazadas de manera inoportuna lo que conlleva a embarazos no deseados. Pero la misma iglesia que las empuja a tomar ese método también condena a las mujeres que practican o desean el aborto, una de las principales causas de muerte materna (36).

f) Lugar de Procedencia

De acuerdo a la definición de la Real Academia Española (RAE), se entiende que el lugar de donde procede una persona es donde se establece principalmente, incluso si no está registrado ni cuenta con autorización de residencia. Este factor puede influir de manera significativa en la elección de métodos anticonceptivos. Por ejemplo, en un estudio realizado en el

departamento de Ayacucho identificó que el uso de los métodos anticonceptivos en los últimos años tiene una tendencia creciente, como producto de los grandes cambios culturales que se observan en las zonas rurales donde predominan los métodos tradicionales en comparación con las zonas urbanas donde predominan los métodos modernos (37).

Factores Institucionales

Los Factores Institucionales refieren a las características de la Institución con respecto a los servicios de salud y atención en el servicio de planificación familiar. Donde la orientación y consejería de manera clara y concisa, junto con una actitud amable por el parte del profesional obstetra, resultará eficaz para un menor rechazo por parte de las puérperas al disipar ideas erróneas que podrían tener acerca de los métodos anticonceptivos. Dichas características tomadas en cuenta en los factores institucionales pueden ser los siguientes: falta de todos los métodos anticonceptivos, actitud del obstetra, información brindada por el profesional obstetra, distancia para acudir al consultorio de planificación, etc.

a) Consejería en métodos anticonceptivos

La difusión de los servicios de Planificación Familiar en el puerperio cumple una función importante en la demanda de los métodos anticonceptivos, siendo ideal que sean dados por profesionales capacitados para evitar conceptos o ideas erróneas sobre los mismos. La orientación y consejería brindada en un Centro de Salud acerca de métodos anticonceptivos, están vinculadas con el derecho fundamental de todas las personas a recibir información completa y actualizada sobre salud sexual y reproductiva. Esto conlleva a explicar la funcionalidad, ventajas, efectos secundarios y tasa de efectividad de todos los métodos anticonceptivos disponibles en el sistema de salud. Es importante que las puérperas tengan conocimientos de los métodos anticonceptivos, ya que hay algunos métodos anticonceptivos que están contraindicados durante el periodo de lactancia materna (18).

b) Disponibilidad de métodos

Todo establecimiento de salud debe contar con un buen abastecimiento de métodos de planificación familiar, puesto que si los métodos anticonceptivos que la mujer en el periodo postparto necesita no están disponibles podría ser un factor que influya en su empleo (22).

La disponibilidad limitada de métodos anticonceptivos modernos y otros servicios de planificación familiar, puede atribuirse a problemas como suministros insuficientes, falta de personal de salud, horarios inflexibles, dificultades de transporte y otros factores. Sea cual fuera la causa, la ausencia de oferta anticonceptiva es un factor estrechamente relacionado con la decisión de uso de MAC en distintos escenarios reproductivos, incluido el puerperio (8).

c) Trato del obstetra

Los profesionales y voluntarios de una institución desempeñan un rol importante al fomentar el acceso de las familias a los diferentes servicios. Es crucial que se respete a las personas, ya que esto vendría a ser un principio ético que debe guiar a todos los profesionales de la salud. Es fundamental asegurar que todas las personas sean tratadas con respeto, sin importar su credo, economía o raza. Las faltas de estas actitudes pueden generar en los usuarios la falta de interés en continuar utilizando el método según sus necesidades. Las personas acuden a los servicios de salud con el propósito de ser atendidas y si el trato es amable obtienen y desarrollan confianza hacia el personal de salud (7).

d) Distancia de vivienda

Considerando la importancia de los diferentes servicios de salud desde el nivel I al nivel III, en proveer insumos a usuarios en todo momento y sobre todo a la población con dificultad de acceso por razones de geografía, lengua, economía, y otros; y así promover estos servicios a la población y de tal forma dar a conocer la magnitud de la importancia de la planificación familiar (7).

e) Horario de atención

Radica en la importancia del cumplimiento de los horarios establecidos por el régimen del servicio civil, por lo que los horarios de atención deben ser de lunes a sábados, con turnos de acuerdo a la necesidad de atención para cubrir la demanda de la población (7).

Factores Personales

Se refiere a diversos atributos y características intrínsecas de cada individuo, los cuales se van consolidando y formando parte de su perfil de personalidad, creando así la diferencia entre ellos (7).

a) Influencia de la pareja

En muchas ocasiones, la actitud del cónyuge juega un papel predominante en la elección de un método anticonceptivo durante el puerperio, sin tener en cuenta la importancia de que esta decisión conlleva una gran responsabilidad y compromiso tanto para la mujer como para su familia. Existen diversos argumentos por la cual el hombre se opone ante la planificación familiar, en ellos se encuentra: el deseo de tener más hijos, mientras que otros objetan al uso de los métodos modernos, incluso algunos no desean usarlos porque temen que sus mujeres les sean infieles si están protegidas contra el embarazo (38).

b) Efectos adversos

El antecedente del uso de los métodos anticonceptivos en las puérperas permite deducir mejor los métodos anticonceptivos que se elegirán en el momento del post parto, en tal sentido las puérperas que hayan presentado efectos secundarios en oportunidades previas de uso de MAC podrían predisponer al rechazo a métodos anticonceptivos en el posparto. Un estudio realizado por Gadea M. mostro que la experiencia negativa relacionada al uso de MAC (RP=8.44; p=0.000) fue uno de los factores asociados al rechazo de MAC, incrementando su frecuencia (18).

c) Conocimientos previos de método anticonceptivos

Estudios realizados en hospitales del interior de país muestran que las puérperas adolescentes con menor grado de conocimientos sobre anticonceptivos tienden a rechazar uso de MAC por desconocimiento; esto evidencia que los saberes previos tienen influencia directa sobre la decisión de uso de MAC (8).

d) Mitos y creencias

En cada región existen diversas creencias arraigadas, mitos y tradiciones, sobre todo en los adultos de la tercera edad. Además, se han difundido mitos relacionados a efectos negativos del uso de métodos anticonceptivos, la mayoría creados o divulgados por su propia familia y medios de comunicación. Estos factores influyen a rechazar o aceptar un método anticonceptivo (39).

e) Importancia de Planificación familiar postparto

La planificación familiar implica el derecho fundamental de cada individuo a tomar decisiones sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, con el objetivo de evitar embarazos de manera libre y responsable evitando así embarazos no planeados y no deseados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la planificación familiar después del parto es una intervención crucial que salva vidas tanto de madres como de hijos, ya que, al promover intervalos intergenésicos de dos o más años, se reduce en un 10% la mortalidad infantil y en un 30% la mortalidad materna (15).

Factores Gineco-obstétricos

En cuanto a los factores gineco-obstétricos se toma en consideración a los antecedentes ginecológicos y obstétricos de la puérpera que podrían conllevar al no uso de un método anticonceptivo, Estos posibles factores asociados son:

a) Tipo de parto

El parto normal es el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su gestación a término, en el que están implicados factores psicológicos y

socioculturales (40). El tipo de parto, según un estudio previamente realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) existen ciertas condiciones obstétricas como el tipo de parto que podrían estar relacionadas con la elección de un método anticonceptivo, pues en dicho estudio 37.2% de pacientes de parto vaginal optaron por usar MAC; mientras que el 33.3% y 42.9% aquellas de parto por cesárea se mostraron indecisas o negaron deseos de usar MAC, Autores como Duba et al. Mencionan que la culminación mencionan que la culminación del parto por cesárea se relaciona e incrementa 1.5 veces la probabilidad de usar MAC en el postparto (8).

b) Paridad

El número de hijos que tiene una mujer es un factor importante a considerar en relación con el uso de un método anticonceptivo durante el periodo postparto. En la investigación de Gadea M. (2021), Se observa que el factor más predominante entre aquellas pacientes que no rechazan el uso de métodos anticonceptivos es la primiparidad (38.3%). En comparación con aquellas que si rechazan (19.0%). En otras palabras, la primiparidad está relacionada con el no rechazo o aceptación de uso de métodos anticonceptivos. Se encontró que la primiparidad redujo en un 57% las probabilidades de rechazo en comparación a aquellas con paridad mayor, siendo las primíparas más propensas a no rechazar uso de MAC (RP=0.43; IC 95%: 0.21-0.90; p=0.017) (8).

a) complicaciones del trabajo de parto

De acuerdo con un estudio realizado por Vara et al. en México, se encontró que podría haber un incremento de 1.1 veces las probabilidades de uso de método anticonceptivo durante el periodo del puerperio. Sin embargo, este incremento en las probabilidades no alcanza a ser significativa ($p > 0.05$), ya que la tasa de complicaciones es de 19.2% y 16.7% en aquellas que aceptaron y rechazaron el uso de métodos anticonceptivos en el puerperio, respectivamente. Autores como Gadea M. (2021) la presencia de complicaciones durante el trabajo de parto ($p=1.000$) y el embarazo

planificado ($p=0.342$) predominaron en el rechazo de MAC, no constituyeron factores asociados (8).

Además de estos factores gineco-obstétricos desarrollados, la literatura menciona que algunos otros como inicio de relaciones sexuales, gestaciones previas, periodo intergenésico, ni ningún otro se relaciona con la elección anticonceptiva en el postparto; sin embargo, hay muchos otros estudios que reportan que estos factores sí podrían influir en la decisión de rechazar el uso de MAC, No obstante, en esta sección teórica solo fueron desarrollados los factores más importantes y los que serán analizados en la presente investigación (8).

2.2.2 Rechazo a Métodos Anticonceptivos

Rechazo

Proceso y resultado de limitar, denegar el uso de algún método anticonceptivo durante el postparto (8).

Métodos anticonceptivos

Se define como cualquier medicación o dispositivo que tiene la función de reprimir significativamente las probabilidades de una concepción después de un encuentro sexual. Estos contribuyen decisivamente en el control de la tasa de natalidad; con esto también, la prevención de embarazos no deseados y embarazos adolescentes. Cabe mencionar que no se puede considerarse ningún método anticonceptivo mejor que otro ni es 100% seguro, ya que cada uno de ellos tiene sus indicaciones y deberá buscarse aquel que sea más idóneo para cada circunstancia y permita una mejor salud sexual (40).

Durante el periodo posparto es ideal el uso de algún método anticonceptivo ya que es un buen momento para educar a mujeres y hombres sobre la importancia del espaciamiento de los hijos, nutrición de la madre y la lactancia materna (19).

Historia

Evitar un embarazo ha sido inquietud de numerosas poblaciones desde tiempos antiguos. Escritos antiguos de origen hebreo, chino y japonés, así como papiros egipcios que corresponden a dinastías gobernantes muchos siglos antes de la era cristiana, ya refieren el uso empírico de algunas pastas y gomas, cuyo efecto, en la actualidad, se ha demostrado que era espermicida (41).

No obstante entre los años 1523- 1562, Gabriel Falopio mostró un precedente del condón que consistía en una vaina elaborada a partir de tripa de animal y lino que se fijaba al pene con una cinta, su finalidad era prevenir las infecciones de transmisión sexual como Sífilis y Gonorrea, muy posiblemente estableció la base dos siglos después para la manufactura de los condones en Inglaterra , que se elaboraron originalmente con intestinos disecados de animales que en 1776 ya eran solicitados en algunos países de Europa, y un siglo después, al inventarse la vulcanización del hule en 1840, empezaban a popularizarse a nivel mundial. Durante el siglo XVIII y parte del XIX, fue el condón el único anticonceptivo usado (41).

En 1920 se concibió la teoría moderna del periodo estéril por Kysaky Ogino, y Knauss, el método de temperatura basal, fue establecido por Vam del Velde en Alemania en 1928, y el método modificado basado en la secreción del mucus desarrollado por Dorairaj es una variante del método de ovulación (41).

El uso de métodos anticonceptivos se remonta desde la antigüedad, todas las civilizaciones tenían la necesidad de evitar un embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, estos métodos han ido evolucionando y se han modernizado, hasta lo que conocemos en la actualidad, siendo éstos eficaces, inocuos y de bajo costo, los cuales se adaptan a las necesidades de cada mujer (41).

Al prescribir un método anticonceptivo se debe considerar los posibles efectos adversos que pudiera tener en la lactancia, en la madre y en la salud del recién nacido. Del mismo modo, debe informarse a las puérperas que el retorno de

la fertilidad puede reiniciarse en un periodo de tres semanas después del parto.

Los métodos anticonceptivos que se pueden administrar en el puerperio son los siguientes:

Métodos anticonceptivos reversibles

a) Métodos naturales

✓ Amenorrea de lactancia (MELA)

Se basa en la supresión natural de la ovulación llevado a cabo gracias a los cambios hormonales que produce la succión del pezón por el recién nacido. Como respuesta al estímulo de la succión del pezón, se produce una mayor secreción de una hormona, la prolactina, que es la encargada de mantener la secreción de leche por la mama, pero también afecta a la función de los ovarios, produciendo modificaciones en ellos que llevan a que no se produzca la ovulación.

La eficacia de la lactancia natural como método anticonceptivo es alta en los primeros meses, siempre que la alimentación del bebe sea exclusivamente materna, y no haya retornado la menstruación, ya que cuando esta aparece la lactancia no evita el embarazo. No obstante, es posible la producción de ovulación aun sin menstruación y una mujer puede quedar nuevamente gestando durante la lactancia. Prácticamente todas las mujeres ovulan nuevamente a los seis meses postparto. (43)

Recomendaciones: La frecuencia de la lactancia al neonato es en un plazo de cada tres horas, La fecha de protección no es definida, aun cuando exista frecuencia y tiempo adecuado de lactancia. Puede reiniciarse la ovulación antes de la primera menstruación posparto, haciéndola este método poco confiable. Es necesario recibir orientación posparto a realizarse 30 o 40 días del puerperio a fin de complementarse con un método que no interfiera con la lactancia. (21)

b) Métodos de Barrera.

Los anticonceptivos de barrera constituyen un obstáculo físico al acceso de los espermatozoides al útero evitando que fertilicen al óvulo. Deben ser utilizados por la mujer o su pareja cada vez que mantienen relaciones sexuales. En general, los métodos de barrera son menos eficaces, pero tienen menos efectos secundarios, que los métodos hormonales o los DIU (43).

Se incluye en estos el preservativo masculino de látex, de poliuretano, preservativo femenino, espermicida, diafragma con espermicida y capuchón cervical. Los preservativos de látex son los únicos anticonceptivos que ofrecen protección contra todas las infecciones de transmisión sexual (ITS), tanto bacterianas como víricas. Los preservativos fabricados con el poliuretano, el poliisopreno o la goma de silicona brindan cierta protección, pero son más finos y se rompen con más facilidad. Tanto en el periodo postparto (con o sin lactancia materna) como postaborto, pueden usar estos métodos (44).

Estos métodos no tienen ningún efecto negativo en la lactancia. Debido a la sequedad vaginal que puede ocurrir durante la lactancia, los condones lubricados utilizados con los espermicidas, son especialmente útiles para evitar la dispareunia. Es recomendable no usar esponjas, capuchones cervicales o diafragmas hasta las 6 semanas del puerperio porque no ha ocurrido la involución de los órganos pélvicos; además, mientras exista sangrado puede aumentar la posibilidad de infección (43) (44).

c) Métodos Hormonales

✓ Anticonceptivos Hormonales Combinados (AHC)

Representan aquellos que tienen en su composición estrógeno y progestágeno. Se incluyen en este grupo: anticonceptivos orales (AOC), el parche hormonal y anticonceptivos inyectables. Es recomendable aplazar el uso de AHC al menos hasta la 4ª semana, esto con el objetivo de que cese el estado de hipercoagulabilidad en las mujeres que no dan de lactar.

✓ **Anticoncepción Hormonal con Gestágenos**

La anticoncepción hormonal con gestágenos en sus distintas formas produce el efecto anticonceptivo tanto a nivel del eje hipotalámico-hipofisiario-ovárico como a nivel periférico. Poseen una alta eficacia anticonceptiva y las investigaciones realizadas hasta el momento no han demostrado efectos negativos sobre la lactancia.

La administración prolongada causará una amenorrea mantenida o metrorragias irregulares sin ninguna significación patológica que debe ser advertida. Es necesario mencionar que estos métodos pueden ser administrados desde el primer día postparto.

✓ **Dispositivos intrauterinos (DIU)**

Los dispositivos intrauterinos (DIU) ya sea los de carga de Cobre como los hormonales, poseen alta eficacia. Su efecto anticonceptivo es producido por una reacción local sobre el endometrio, provocando una reacción inflamatoria aséptica y un efecto espermicida, sin causar ninguna repercusión general lo cual lo hacen un método anticonceptivo perfectamente utilizable durante el periodo del puerperio. Los efectos secundarios en el postparto son los mismos en el que cuando se utilizan en condiciones normales, sin embargo, debe advertirse en dos inconvenientes: la mayor tasa de expulsiones y mayor riesgo de perforaciones uterinas al insertarlos. Los DIU pueden insertarse en el puerperio inmediato, pero probablemente el momento ideal sea a partir de la sexta semana postparto. La cesárea previa no supone una contraindicación para la inserción del DIU, aunque en ese caso siempre será necesario esperar como mínimo hasta la sexta semana postparto. (22)

Anticoncepción irreversible

a) Anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV)

Consiste en la oclusión bilateral de las trompas de Falopio por ligadura, corte, sección, cauterización, o colocación de anillos, clips, grapas o dispositivos intratubarios. La norma técnica de PPF del MINSA indica que la anticoncepción quirúrgica voluntaria, también conocida como bloqueo

tubárico bilateral se realiza mediante una minilaparotomía dentro de las 24 horas del posparto, pudiendo realizarse bajo anestesia local y previamente habiendo brindado orientación/consejería anteparto así como consentimiento informado (8).

2.1. Bases Conceptuales

Factores que influyen: Se refiere a los diferentes aspectos que interceden, para que una cosa sea de un modo determinado, actúan como causa e inciden en algo, que se convierte en el efecto. Esta relación de causa y efecto no es de tipo lógico o matemático, sino que los factores tienen un nivel de influencia sobre un hecho, pero su determinación no es absoluta (46).

Rechazo: Proceso y resultado de limitar, denegar el uso de algún método anticonceptivo durante el postparto (8)-

Métodos anticonceptivos: Procedimiento que previene o reduce significativamente las posibilidades de una fecundación en mujeres fértiles, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. En lo posible, los métodos anticonceptivos deben cumplir con requisitos y características que permitan a las personas alcanzar sus metas reproductivas en forma efectiva y segura para su salud y de acuerdo a su situación de vida (47).

Puerperio: Es la etapa que inicia desde el final del parto hasta la aparición de la primera menstruación. En este tiempo se desarrollan simultáneamente multitud de cambios fisiológicos en la mujer con la finalidad de retornar gradualmente al estado pre gravídico y establecer la lactancia (48).

2.2. Bases Antropológicas

Evitar el embarazo ha sido preocupación de muchas generaciones desde tiempos antiguos donde en temas de planificación familiar no se conocían métodos anticonceptivos eficaces, pues no había mucha evidencia científica, además de que existían barreras socioculturales y religiosas. Las mujeres utilizaban y confiaban en métodos anticonceptivos caseros orales, o lavados para evitar que el espermatozoide fertilizara el óvulo, esto a partir de hierbas, métodos anticonceptivos de barrera caseros a partir de entrañas de animales

y otros ingredientes para bloquear el semen, los cuales se aplicaban dentro o sobre los genitales para evitar el embarazo (49). Esto muestra que el comportamiento sexual en el hombre no es simplista, pues influye mucho el contexto socio histórico y cultural en que se desarrolla. En un inicio, el hombre no tenía conocimiento de la relación entre el encuentro sexual y la procreación, por lo que atribuía el nacimiento de los hijos a la intervención de fuerzas divina.

Desde el momento en que se conoce de la capacidad reproductiva, inicia la búsqueda de métodos para evitar los embarazos no planificados, ya que en demasiadas ocasiones suponían una carga y también una responsabilidad social, de ahí que la reproducción humana apele desde tiempos antiguos a los métodos anticonceptivos, con el fin de dar a su descendencia todo lo necesario que supone la creación de una nueva vida, controlando así la tasa de natalidad para que puedan decidir libre y responsablemente la cantidad de hijos que desean tener, así como el espaciamiento entre hijo a hijo y la creación de una planificación familiar efectiva que le permitan a la mujer pensar y vivir la maternidad no como su destino, sino como su opción de elegir (aceptar o rechazar) que estará condicionada por la concientización, la educación sexual, y accesibilidad a la tecnología anticonceptiva (50). Durante las últimas décadas la industria farmacéutica ha creado una diversidad de métodos, desde de los anticonceptivos orales combinados de altas dosis a los de bajas dosis, pasando por los dispositivos intrauterinos (DIU) inertes a los de cobre y a los de progestágenos. Incluso actualmente se encuentran disponibles en el mercado anticonceptivos inyectables combinados y de progestágenos, los implantes subdérmicos, el parche dérmico y el anillo vaginal hormonal combinado. (50). Como vemos, el uso de la anticoncepción desde tiempos atrás nos demuestra que la sociedad, independientemente de su posición, ha comprendido la necesidad de controlar la natalidad y que, debido a su evolución contamos con anticonceptivos eficaces y económicos (52)

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. **Ámbito**

El estudio se realizó en el Hospital Materno Infantil “Carlos Showing Ferrari” ubicado en el jirón Micaela Bastidas N° 207, distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de Huánuco. Con categoría II-E en atención especializada en el campo clínico de Gineco-obstetricia y pediatría, brindando servicios a la comunidad amarilense, con capacidad resolutive de atención ambulatoria, emergencia e internamiento, siendo un hospital centro de referencias.

3.2. **Población**

La población estuvo constituida por 125 puérperas hospitalizadas en el servicio de Puerperio del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, Huánuco, Marzo – Mayo del 2023.

3.3. **Muestra**

La muestra estuvo conformada por 81 puérperas, la cual fue estimada por la fórmula para población conocida (finita); teniendo en consideración una población de 125, una confiabilidad del 95% y una prevalencia del 50%.

Fórmula:

$$n = \frac{Z\alpha^2 \cdot N \cdot p \cdot q}{i^2 (N - 1) + Z\alpha^2 \cdot p \cdot q}$$

Dónde:

$$n = \frac{1,96^2 * 125 * 0,5 * 0,5}{0.05^2(125 - 1) + 1,96^2 * 0,5 * 0,5}$$

$$n = \frac{92.92}{1.215} = 81.39$$

$$n = 81 \text{ puerperas}$$

Criterios de inclusión

- Puérperas que desearon formar parte del estudio, firmando el consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Puérperas que no desearon formar parte del estudio y no firmaron el consentimiento informado.

Tipo de Muestreo

El tipo de muestreo fue el probabilístico en su modalidad aleatorio simple, es decir, todos los elementos de la población tuvieron la misma posibilidad de ser escogidos.

Nivel y Tipo de estudio

Nivel de estudio

El nivel de estudio fue relacional, porque se estudió la relación entre los factores y el rechazo a los métodos anticonceptivos en puérperas, a partir de sus dimensiones e indicadores en el ámbito donde se desarrolló (53).


Tipo de estudio

De acuerdo a la clasificación de la Dra. Elia Beatriz Pineda (53), el tipo de investigación fue de la siguiente manera:

- ✓ Según la intervención del Investigador el estudio fue de tipo no experimental, porque no se manipularon ninguna de las variables, y los hallazgos encontrados mostraron de manera natural la relación que existe entre los factores que influyen en el rechazo de métodos anticonceptivos posparto en mujeres puérperas.
- ✓ Según la planificación de la toma de datos el estudio fue de tipo prospectivo, porque la información fue recolectada desde el momento en que se ejecutó la investigación, a través de una fuente información primaria mediante la aplicación de los instrumentos de investigación en las usuarias consideradas en el estudio.
- ✓ Según el periodo y secuencia de estudio, fue de tipo transversal, porque las variables fueron medidas solo una vez y los instrumentos de investigación fueron aplicados en la muestra en estudio en única ocasión.
- ✓ Según el análisis y alcance de los resultados, fue de tipo descriptivo, porque se buscaron especificar las características de los factores que influyen en el rechazo de métodos anticonceptivos posparto en mujeres puérperas, tal como se presentan en su contexto natural sin ejercer manipulación de las variables en estudio.

3.4. Diseño de investigación

El diseño que se utilizó en la investigación es de tipo no experimental, descriptivo, relacional (53). El diagrama del diseño es el siguiente:



Dónde:

M = Representó a la muestra en el estudio.

O1 = Representó la variable independiente (Factores)

r = Representó la relación entre las variables.

O2 = Representó la variable dependiente (rechazo a métodos anticonceptivos)

3.5. Métodos, técnicas e Instrumentos

Método

En la presente investigación se utilizó el método científico porque permite ordenar la investigación a través de un conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento para llevarse a cabo la investigación, también se utilizó el método deductivo que es la más útil en la comprobación de hipótesis, pues ofrece la posibilidad de explicar las relaciones causales entre los conceptos y las variables siendo propio de la investigación cuantitativa (55)

Técnicas de recolección de datos

En este estudio se utilizó la técnica de la encuesta, esta técnica tiene como fin obtener información de una muestra definida, mediante un instrumento tipo cuestionario, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información necesaria para nuestra investigación (53).

Instrumentos de recolección de datos

El instrumento que se empleó fue el cuestionario, elaborado por las investigadoras de acuerdo a lineamientos obtenidos de la matriz operacional. El instrumento estuvo conformado por 20 preguntas, los primeros 6 ítems se basaron en evaluar los aspectos sociodemográficos de las pacientes, los ítems del 7 al 11 evaluaran los aspectos institucionales, los ítems del 12 al 16 evaluaran los aspectos personales

de las pacientes, el ítem del 17 al 19 evaluaron datos y recabaron información sobre aspectos relacionados a la parte ginecológica u obstétrica de las pacientes puérperas finalmente el ítem 20 evaluó los datos de la variable dependiente .

3.6. Validación y confiabilidad de los instrumentos

Validación de los instrumentos

El empleo de los instrumentos de recolección de datos estuvo sujeto a un proceso de validación para garantizar que los instrumentos mencionados sean aptos para su uso.

Validez racional

Para garantizar que los elementos de los instrumentos de recolección de datos estuvieran representados con precisión, se realizó una revisión de varios libros y antecedentes de investigación sobre las variables en estudio.

Validación de contenido

Del mismo modo, la validación se realizó mediante el método de delphi, en donde se tuvo la participación de expertos y jueces, quienes evaluaron de manera independiente cada ítem registrado en los instrumentos de recolección de datos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: pertinencia, coherencia, suficiencia y claridad.

Los expertos y jueces evaluadores fueron elegidos en función de su especialización en el tema de estudio, para que puedan evaluar de forma crítica cada ítem y dimensión considerado en los instrumentos. A quienes se les proporciono la matriz de consistencia del proyecto, el instructivo, el formato para la validación y los instrumentos de recolección de datos para la respectiva revisión.

JUEZ	CALIFICACIÓN CUANTITATIVA	CALIFICACION CUALITATIVA
Obstetra. Noemi Alvarado Vicente	20	MUY BUENO
Obstetra. Sara Escobar Porras	20	MUY BUENO
Obstetra. Gabriela Cabrera Martínez	20	MUY BUENO
Med. Ginecólogo, Jorge Luis paredes Rojas	20	MUY BUENO
Med. Ginecólogo, Fredy Aguilar Guerrero	20	MUY BUENO

Prueba piloto

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a una prueba piloto en 10 pacientes puérperas del Hospital Regional Hermilio Valdizán a los que se aplicó el instrumento. Esto permitió determinar si los mencionados instrumentos son adecuados para la comprensión de las puérperas en estudio.

Confiabilidad de los instrumentos

Con los resultados obtenidos en la prueba piloto se procedió a realizar la prueba de confiabilidad del cuestionario mediante la prueba estadística del coeficiente de Alfa de Cronbach, donde se obtuvo un valor estadístico de 0.85 demostrando que el instrumento presenta una fuerte confiabilidad.

Alfa de Cronbach	Nº de elementos
0.852	20

Nota. SPSS Versión 25

CRITERIO DE FIABILIDAD	VALORES
No es fiable	-1 a 0
Baja fiabilidad	0,01 a 0,49
Moderada fiabilidad	0,5 a 0,69
Buena fiabilidad	0,7 a 0,79
Fuerte fiabilidad	0,80 a 0,89
Alta fiabilidad	0,9 a 1

3.7. Procedimientos

Se llevó a cabo por diferentes etapas para su ejecución total, los cuales fueron aprobadas y pasadas con éxito.

1. Se presentó la solicitud para la aprobación del proyecto de tesis, a la facultad de Obstetricia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Asimismo, con la resolución otorgada se tramitó el permiso en la institución hospitalaria Carlos Showing Ferrari en coordinación con los profesionales, para la aplicación de los cuestionarios en la población seleccionada.
2. Luego de acuerdo a los criterios de selección se identificó la muestra de estudio (mujeres puérperas),
3. Se brindó el consentimiento informado para establecer el contacto inicial con las mujeres puérperas para su participación voluntaria.
4. Se procedió a la lectura del consentimiento informado, indicando que el tiempo estimado para la encuesta.
5. A los instrumentos se les asignó un número de folio, lo que permitió identificar a cada participante, ya que todos fueron anónimos. Esto ayudó al ingreso ordenado en la base de datos.

3.8. Tabulación y análisis de datos

Tabulación de datos

- **Revisión de los datos:** previo al procesamiento de los datos, los registros del instrumento utilizados fueron sometidos a una revisión rigurosa y detallada para verificar la integridad y consistencia de las respuestas alcanzadas.
- **Codificación de datos:** Los ítems del instrumento fueron tabulados, previa codificación numérica de acuerdo a la respuesta esperada, y para la variable se basó en lo definido en el marco teórico propuesto.
- **Clasificación de datos:** los datos encontrados se clasificaron por el tipo de variable y la medida de su valor (escala valorativa).
- **Procesamiento de datos:** luego de codificar la información, se preparó en una tabla de datos utilizando los procedimientos estadísticos de SPSS versión 22 en español y MS Excel 2016, así se registra los datos del instrumento, sin olvidar emparejar los datos utilizados.
- **Presentación de datos:** los datos se presentaron en tablas y figuras estadísticas de frecuencias y proporciones para la parte descriptiva, así como pruebas de asociación para la parte inferencial según los parámetros de la normativa de Vancouver.

Análisis de datos

Los datos se ingresaron el software del programa Excel 2016 y luego se transfirieron al estadístico SPSS versión 22 para Windows, donde fueron expresados en tablas y gráficos utilizando estadísticas descriptivas e inferenciales.

- **Análisis descriptivo:** Se efectuó utilizando la estadística descriptiva con la distribución de frecuencias absolutas y relativas. en el cual se obtuvieron las tablas de frecuencias y gráficos de los resultados de la investigación.

- **Análisis inferencial:** Permitió el análisis de las tablas de contingencia (2x2) para interpretar la prueba de hipótesis a través del uso de fórmulas matemáticas, en la cual se utilizó la prueba de influencia de chi-cuadrado.

3.9. Consideraciones éticas

El presente estudio contó con la participación de las puérperas que aceptaron o no métodos anticonceptivos postparto con el fin de conocer aquellos factores relacionados al problema de investigación. Todos los procedimientos aplicados se enmarcaron de acuerdo a las directrices éticas establecidas en la declaración de Helsinki que tiene como principales principios básicos los siguientes:

Justicia: se brindó a todas las pacientes el mismo nivel de atención y respeto, independientemente de sus características personales, sin ningún acto de discriminación o preferencias. reflejando el compromiso con la imparcialidad y la equidad en la interacción con cada paciente.

Autonomía: Para la participación de las puérperas en este estudio, se les brindo un consentimiento informado, donde se detalló los objetivos, haciendo énfasis de que su participación sería voluntaria y podrían retirarse en cualquier momento si así lo deseaban.

Beneficencia: este principio alude a “Hacer el bien”, refiriéndose al compromiso de índole moral, evitando producir posibles daños ya que no se manipularon a las puérperas que conformaron el estudio.

No maleficencia: Alude al principio denominado “no hacer daño”, Se protegió la vida, la salud, la intimidad y la dignidad de las puérperas que participaron en el estudio, resguardando la identidad, para ello los instrumentos fueron codificados, evitando difundir sus datos personales. (55).

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Análisis descriptivo

Tabla 01. Edad de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Edad	n=81	
	N°	%
< de 18 años	5	6.2
18 a 23 años	24	29.6
24 a 29 años	27	33.3
30 a 35 años	13	16.0
> de 35 años	12	14.8
Total	81	100.0

Fuente: Cuestionario de recolección de datos (Anexo 03)

Interpretación

En la tabla 01, referente a la edad de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari”, del total de puérperas en estudio 100.0%(81), se evidencia que un tercio tenían entre 24 y 29 años 33.3%(27), seguido de un 29.6%(24) quienes tenían entre 18 y 23 años y solo el 6.2%(2) eran menores de 18 años.




Figura 01. Descripción grafica de la edad de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 01, referente a la descripción grafica del factor sociodemográfico “Edad”, del total de puérperas en estudio 100.0%(81), se evidencia que un tercio tenían entre 24 y 29 años 33.3%(27), seguido de un 29.6%(24) quienes tenían entre 18 y 23 años, el 16 %(13) tenían intervalos entre 30 a 35 años, el 14.8%(12) eran mayores de 35 años y solo el 6.2%(2) tenía menos de 18 años.

Tabla 02. Descripción de los factores sociodemográficos de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Factores sociodemográficos	n=81	
	N°	%
Ocupación		
Estudiante	20	24.7
Ama de casa	47	58.0
Trabajo independiente	40	12.3
Empleado	4	4.9
Grado de instrucción		
Sin instrucción	3	3.7
Primaria	11	13.6
Secundaria	35	43.2
Superior	32	39.5
Residencia		
Rural	23	28.4
Urbano	51	63.0
Urbano marginal	7	8.6
Estado civil		
Conviviente	51	63.0
Casada	16	19.8
Soltera	14	17.3
Religión		
Católica	49	60.5
Evangélica	23	28.4
Otros	9	11.1
Total	81	100.0

Fuente: Cuestionario de recolección de datos (Anexo 03)

Interpretación

En la tabla 02, respecto a la descripción de los factores sociodemográficos de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari”, del total de puérperas en estudio 100.0%(81), se aprecia que más de la mitad eran amas de casa 58.0%(47) y el 4.9%(4) empleadas; en cuanto al grado de instrucción en mayor cantidad habían estudiado hasta la secundaria 43.2%(35) y el 3.7%(3) eran analfabetas; respecto a la residencia en su mayoría vivían en zona urbana 63.0%(51) y el 8.6%(7) en zona urbano marginal; en su mayoría profesaba la religión católica y eran convivientes , siendo estos el 60.5%(49) y el 63.0 %(51).




Figura 02. Descripción gráfica de la ocupación de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 02, respecto a la descripción gráfica del factor sociodemográfico “Ocupación” del total de puérperas en estudio 100.0%(81), se aprecia que más de la mitad eran amas de casa 58.0%(47), el 24.7%(20) estudiantes, el 12.3% (40) trabajador independiente y solo el 4.9%(4) eran empleadas.




Figura 03. Descripción grafica del grado de instrucción de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 03, respecto a la descripción grafica del factor sociodemográfico “Grado de instrucción” del total de puérperas en estudio 100.0%(81), se aprecia que en mayor cantidad habían estudiado hasta la secundaria 43.2%(35), el 39.5% (32) el nivel superior, el 13.6% (11) nivel primario y el 3.7%(3) eran analfabetas.




Figura 04. Descripción grafica de la residencia de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 04, respecto a la descripción grafica del factor sociodemográfico “Residencia” del total de puérperas en estudio 100.0% (81), se observa que en su mayoría vivían en zona urbana 63.0% (51), zona rural 28.4% (23) y el 8.6% (7) en zona urbano marginal.




Figura 05. Descripción grafica del estado civil de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 05, en relación a la descripción grafica del factor sociodemográfico “Estado civil”, del total de puérperas en estudio 100.0%(81), se observa que en su mayoría eran convivientes siendo el 63.0 %(51), casadas un 19.8% (16), solteras solo el 17.3%(14).




Figura 06. Descripción grafica de la religión de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 06, respecto a la descripción grafica del factor sociodemográfico “Religión” del total de puérperas en estudio 100.0%(81), se observa que en su mayoría profesaba la religión católica 60.5%(49), el 28.4% (23) evangélicas y solo el 11.1% (9) otras religiones.

Tabla 03. Descripción de los factores institucionales de las púerperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Factores institucionales	n=81			
	Si		No	
	N°	%	N°	%
Recibió información por parte del profesional de obstetricia sobre métodos anticonceptivos después del parto	55	67.9	26	32.1
Considera Ud. que el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari dispone de todos los métodos anticonceptivos	51	63.0	30	37.0
El personal de salud mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial	74	91.4	7	8.6
Considera que la distancia de su vivienda al hospital es un factor para no acudir al consultorio de planificación para recibir su método anticonceptivo	52	64.2	48	35.8
Usted sabe los horarios de atención del servicio de planificación familiar	36	44.4	45	55.6

Fuente: Cuestionario de recolección de datos (Anexo 03)

Interpretación

En la tabla 03, referente a la descripción de los factores institucionales de las púerperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari”, del total de púerperas en estudio 100.0%(81), se aprecia que en su gran mayoría afirmaban que el personal de salud mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial 91.4%(74), así también la mayoría afirmaba que recibió información por parte del profesional de obstetricia sobre métodos anticonceptivos después del parto 67.7%(55); en tanto el 64.2%(52) considera que la distancia de su vivienda al hospital es un factor para no acudir al consultorio de planificación para recibir su método anticonceptivo, por otro lado el 55.6%(45) no sabe el horarios de atención del servicio de planificación familiar.




Figura 07. Descripción grafica del factor: Recibió información por parte del profesional de obstetricia sobre métodos anticonceptivos después del parto, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 07, referente a la descripción grafica del factor institucional “Recibió información por parte del profesional de obstetricia sobre métodos anticonceptivos después del parto”, del total de puérperas en estudio 100.0% (81), se aprecia que en su gran mayoría afirmaban haber recibido información por el personal de obstetricia 67.9% (55) y el 32.1% (26) decían no haber recibido información por parte del personal de obstetricia sobre métodos anticonceptivos.




Figura 08. Descripción grafica del factor: Considera Ud. que el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari dispone de todos los métodos anticonceptivos, en púerperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 08, referente a la descripción grafica del factor institucional “Considera Ud. que el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari dispone de todos los métodos anticonceptivos”, del total de púerperas en estudio 100.0% (81), se aprecia que en su mayoría afirmaban que el hospital dispone de todos los métodos anticonceptivos 63% (51) y solo el 37% (30) dijo que el hospital no dispone de todos los métodos anticonceptivos.




Figura 09. Descripción grafica del factor: El personal de salud mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial, en púerperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 09, referente a la descripción grafica del factor institucional “El personal de salud mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial”, del total de púerperas en estudio 100.0% (81), se aprecia que el personal de salud mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial 91.4% (74), y solo el 8.6% (7) dijo que el personal de salud no mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial.




Figura 10. Descripción grafica del factor: Considera que la distancia de su vivienda al hospital es un factor para no acudir al consultorio de planificación para recibir su método anticonceptivo, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 10, referente a la descripción grafica del factor institucional: “Considera que la distancia de su vivienda al hospital es un factor para no acudir al consultorio de planificación para recibir su método anticonceptivo”, del total de puérperas en estudio 100.0%(81), se observa que el 64.2%(52) consideran que la distancia de su vivienda al hospital si es un factor para no acudir al consultorio de planificación para recibir su método anticonceptivo, un 35.8%(48) dijo que no es un factor para acudir al consultorio de planificación para recibir su método anticonceptivo.




Figura 11. Descripción grafica del factor: Usted sabe los horarios de atención del servicio de planificación familiar, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 11, referente a la descripción grafica del factor institucional “Usted sabe los horarios de atención del servicio de planificación familiar”, del total de puérperas en estudio 100.0% (81), se observa que el 55.6% (45) no saben los horarios de atención del servicio de planificación familiar y el 44.4% (36) refirió que si sabe los horarios de atención.

Tabla 04. Descripción de los factores personales de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Factores personales	n=81			
	Si		No	
	N°	%	N°	%
Cree usted que su pareja influye negativamente en el uso de métodos anticonceptivos	23	28.4	58	71.6
Usted presento algún malestar al usar algún método anticonceptivo y que haya provocado que lo dejara de usar	40	49.4	41	50.6
Usted tiene conocimiento de cómo actúan los métodos anticonceptivos en su cuerpo	37	45.7	44	54.3
Escuchó algún mito o creencia sobre algún método anticonceptivo	22	27.2	59	72.8
Considera que usar métodos anticonceptivos después del parto es importante	63	77.8	18	22.2

Fuente: Cuestionario de recolección de datos (Anexo 03)

Interpretación

En la tabla 04, respecto a la descripción de los factores personales de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari”, del Del total de puérperas en estudio 100.0%(81), se evidencia que en su gran mayoría consideran que usar métodos anticonceptivos después del parto es importante en un 77.8 % (63), así también el 72,8%(59) no escucharon algún mito o creencia sobre algún método anticonceptivo, el 71.6%(58) no consideran que su pareja tenga una influencia negativa al uso de métodos anticonceptivo, en tanto más de la mitad mencionaban no tener conocimiento de cómo actúan los métodos anticonceptivos en su cuerpo y que no presentaron algún malestar al usar algún método anticonceptivo y que haya provocado que lo dejara de usar 54.3%(44) y 50.6%(41) respectivamente.




Figura 12. Descripción grafica del factor: Cree usted que su pareja influye negativamente en el uso de métodos anticonceptivos, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 12, respecto a la descripción grafica del factor personal “Cree usted que su pareja influye negativamente en el uso de métodos anticonceptivos”; del total de puérperas en estudio 100.0% (81), se evidencia que un 71,6% (58) considera que su pareja no influye; por otro lado, un 28,4% (23) refirió que su pareja si influye negativamente en el uso de métodos anticonceptivos.




Figura 13. Descripción grafica del factor: Usted presento algún malestar al usar algún método anticonceptivo y que haya provocado que lo dejara de usar, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 13, respecto a la descripción grafica del factor personal “Usted presentó algún malestar al usar algún método anticonceptivo y que haya provocado que lo dejara de usar”; del total de puérperas en estudio 100.0% (81), un 50,6% (41) manifestó que no presentó algún malestar, mientras un 49,4% (40) indicó que si presentó algún malestar al momento de usar algún método anticonceptivo.




Figura 14. Descripción grafica del factor: Usted tiene conocimiento de cómo actúan los métodos anticonceptivos en su cuerpo, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 14, respecto a la descripción grafica del factor personal “Usted tiene conocimiento de cómo actúan los métodos anticonceptivos en su cuerpo”, del total de puérperas en estudio 100.0% (81), un 54,3% (44) refirió que no tiene conocimiento y el 45,7% (37) indicó que si tiene conocimiento de cómo actúan los métodos anticonceptivos en su cuerpo.




Figura 15. Descripción grafica del factor: Escuchó algún mito o creencia sobre algún método anticonceptivo, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 15, respecto a la descripción grafica del factor personal “Escuchó algún mito o creencia sobre algún método anticonceptivo”; del total de puérperas en estudio 100.0% (81), se observa que el 72,8% (59) no lo escuchó, mientras que un 27,2% (22) mencionaron que si escuchó algún mito o creencia sobre algún método anticonceptivo.




Figura 16. Descripción grafica del factor: Considera que usar métodos anticonceptivos después del parto es importante, en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 16, respecto a la descripción grafica del factor personal “Considera que usar métodos anticonceptivos después del parto es importante”; del total de puérperas en estudio 100.0% (81), un 77,8% (63) consideró que si, por otro lado, un 22,2% (18) mencionó que no es importante usar método anticonceptivo después del parto.

Tabla 05. Descripción de los factores gineco-obstétricos de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Factores gineco-obstétricos	n=81	
	N°	%
Tipo de parto		
Parto Vaginal	34	42.0
Parto por cesárea	47	58.0
Número de hijos		
1	34	42.0
2 a 5	45	55.4
Mayor a 5	2	2.5
Complicaciones durante y después del parto que le impida utilizar algún Método anticonceptivo		
Si	6	7.4
No	75	92.6
Total	81	100.0

Fuente: Cuestionario de recolección de datos (Anexo 03)

Interpretación

En la tabla 05, respecto a la descripción de los factores gineco-obstétricos de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari”, del total de puérperas en estudio 100.0%(81), se aprecia que más de la mitad tuvo un parto por cesárea 58.0%(47), en cuanto al número de hijos más de la mitad menciona que fueron de 4 a 5 siendo el 55.4%(45) y el 2.5%(2) mayor a 5; así mismo la mayoría afirmaba que las complicaciones durante y después del parto no le impedía utilizar algún Método anticonceptivo durante la etapa del puerperio.




Figura 17. Descripción grafica del tipo de parto de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 17, respecto a la descripción grafica del factor gineco-obstétrico “Tipo de parto”; del total de puérperas en estudio 100.0% (81), se aprecia que el parto por cesárea representó el 58% (47), y el parto vaginal el 42% (34).




Figura 18. Descripción grafica del número de hijos de las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 18, respecto a la descripción grafica del factor gineco-obstétrico “número de hijos” del total de puérperas en estudio 100.0% (81); un 55,4% (45) mencionó tener entre 2 a 5 hijos; un 42% (34), un hijo y un 2,5% (2) más de 5 hijos.




Figura 19. Descripción grafica de las complicaciones durante y después del parto que le impida utilizar algún Método anticonceptivo las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 19, respecto a la descripción grafica del factor gineco-obstétrico “Complicaciones durante y después del parto que le impida utilizar algún Método anticonceptivo”; del total de puérperas en estudio 100.0% (81), se aprecia que un 92,6% (75) manifestó que no, asimismo un 7,4% (6) mencionó que si presentó complicaciones durante o después del parto que le impidan utilizar algún método anticonceptivo.

Tabla 06. Rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023”.

Rechazo a métodos anticonceptivos	n=81	
	N°	%
Si	51	63.0
No	30	37.0
Total	81	100.00

Fuente: Cuestionario de recolección de datos (Anexo 03)

Interpretación

En la tabla 06, respecto al rechazo a métodos anticonceptivos las puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari”, del total de puérperas en estudio 100.0% (81), se aprecia que más en su mayoría habían presentado rechazo 63.0% (51) y el 37.0% (30) no presentaron rechazo por los métodos anticonceptivos o si habían optado por un método anticonceptivo.




Figura 20. Descripción grafica del rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Interpretación

En la figura 20, en relación al rechazo a métodos anticonceptivos; del total de puérperas en estudio 100.0% (81), se aprecia que el 63% (51) rechazaron y el 37% (30) no presentaron rechazo o si habían optado por un método anticonceptivo.

Análisis inferencial

Contrastación de hipótesis

Tabla 07. Factores sociodemográficos, institucionales, personales, gineco-obstétricos que influyen en el rechazo a métodos en púerperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Factores	Chi²	GI	Significancia o P valor
Factores sociodemográficos			
Grado de instrucción	11.357	3	0.010
Factores institucionales			
Recibió Información por parte del personal de obstetricia sobre MAC	12.280	1	0.001
Considera Ud. que el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari dispone de todos los MAC	11.328	1	0.008
Considera que la distancia de su vivienda al hospital es un factor para no acudir al consultorio de planificación para recibir su MAC	9.698	1	0.046
Usted sabe los horarios de atención del servicio de planificación familiar	9.026	1	0.044
Factores personales			
Cree usted que su pareja influye negativamente en el uso de MAC	13.156	1	0.000
Usted presento algún malestar al usar algún MAC y que haya provocado que lo dejara de usar	12.149	1	0.001
Usted tiene conocimiento de cómo actúan MAC en su cuerpo	9.359	1	0.021
Escuchó algún mito o creencia sobre algún MAC	8.994	1	0.032
Considera que usar MAC después del parto es importante	12.178	1	0.000
Factores Gineco-obstétricos			
Tipo de parto	10.051	1	0.003
Número de hijos	9.890	1	0.032

Complicaciones durante y después del parto que le impida utilizar algún Método anticonceptivo	12.467	1	0.000
---	--------	---	-------

Fuente: Tablas de anexos 4, 5, 6 y 7

Interpretación

En la tabla 07, mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado se halló que: los factores que influyen al rechazo de métodos anticonceptivos fueron: factores sociodemográficos como el grado de instrucción (pv=0.010); factores institucionales como la información brindada por el personal de obstetricia (pv=0.001), disponibilidad de todos los métodos anticonceptivos (pv=0.008), el saber los horarios de atención del servicio de planificación familiar (pv=0.044) y la distancia de la vivienda al hospital (pv=0.046); los factores personales como influencia negativa de la pareja (pv=0.000), seguido la importancia de usar métodos anticonceptivos después del parto (pv=0.000), malestar al uso de algún método anticonceptivo (pv=0.001), conocimientos sobre métodos anticonceptivos (pv=0.021), y creencias o mitos sobre métodos anticonceptivos (pv=0.032); los factores gineco-obstétricos como complicaciones durante o después del parto (pv=0.000), tipo de parto (pv=0.003), y número de hijos (pv=0.032). Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

El estudio demuestra que, existen factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari - Amarilis, 2023. Puesto que, al analizar las variables, se hallaron datos significativos ($p < 0.05$)

Lo encontrado en la investigación referido al factor sociodemográfico se halló que en su mayoría eran amas de casa, con el grado de instrucción de nivel secundario, de residencia urbana, convivientes y profesaban religión católica. siendo el grado de instrucción el único indicador que influye al rechazo. Lo cual guarda relación con el estudio de Hernández, M. y Huamani, JV. (24) encontró que los factores sociodemográficos y familiares en las puérperas para la elección de métodos anticonceptivos son: 78% son edad adulta, provenían de zonas urbanas (52%), nivel secundario 86%). Asimismo, Gadea. (19) refiere que, el nivel de educación secundaria (70,9%), se asocian al rechazo de MAC. Ambos estudios mencionados son congruentes con la investigación.

En cuanto a los factores personales como influencia negativa de la pareja ,efectos adversos, conocimiento de cómo actúan en su cuerpo, mitos y rumores, importancia de uso después del parto , influyen significativamente al rechazo, entre estudios congruentes tenemos a Vázquez R. (9) refiere que los factores que motivan a rechazar los métodos anticonceptivos en el puerperio inmediato, fue por motivo de temor a los efectos secundarios (40%), El 15.6% por desconfianza y Un 8.9% por mitos y rumores, el 6,7% se debía a falta de aprobación del marido.

Otro estudio es el de, Romo, G et AL. (11) indica que, los factores personales influyentes en la aceptación de los métodos anticonceptivos en las puérperas, es del 33.6 % atribuidas al esposo. Asimismo; Alvarado, PF (16). Indica a la actitud de la pareja ($p= 0.000$) se asocia a la no elección del método anticonceptivo(16). Los datos referidos de ambos estudios guardan relación con la presente investigación.

De igual manera se coincide con Cano, LA; López, A (13). Mencionan que la causa más frecuente de rechazo hacia los métodos anticonceptivos en puérperas fue el temor a los efectos secundarios (28.7%), seguida por los mitos y rumores sobre los métodos (21.8%) y la tercera causa fue la falta de conocimiento acerca de los métodos de planificación familiar (19.5%).

Respecto a factores institucionales se encontró que el 67.9%(55) afirmaron que recibió Información por parte del personal de obstetricia sobre MAC, el 63.0%(51) considera que el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari dispone de todos los MAC, el 64.2%(52) la distancia de su vivienda al hospital es un factor para no acudir al consultorio de planificación familiar, en tanto el 55.6%(45) sabe los horarios de atención del servicio de planificación familiar, la cual discrepa con el estudio de Analuisa, EI; Huilcapi, AO. (12) explica que los factores institucionales, que influyen en la aceptación del método anticonceptivo fue debido a que no era de su interés en ese momento (23%), un 19% preferían acudir a centros de salud privados, Un 16% disponibilidad de tiempo por motivo del trabajo. A diferencia de la investigación de. Macayo E. (14) menciona que un 72% recibieron información por parte de la matrona, guardando similitud con los resultados de la investigación.

Asimismo, Mendoza, N. (19) señala que los factores institucionales, influyen en la aceptación del método anticonceptivo en puérperas puesto que, un elevado porcentaje de mujeres que recibieron una correcta información sobre el uso de métodos anticonceptivo durante el posparto.

En tanto, al analizar los factores Gineco-obstétricos que influyen al rechazo, se encontró que la mayoría habían tenido partos por cesárea (58.0%), tenían entre 2 y 5 hijos (55.4%), el (92.6%) no presentaron complicaciones que le

impida usar métodos anticonceptivos, el estudio difiere con Celestino A. (22) que señala que los factores gineco-obstétricos no se asociaron al uso de métodos anticonceptivos en el postparto ($p>0.05$); asimismo Reyes, M (21). señalo que, los factores de tipo gineceo-obstétrico fueron: partos vaginales (50.4%), asociándose a la aceptación de métodos anticonceptivos ($p=0.046$). Por su parte, Ramírez, JD. (16) refiere que en su mayoría tienen 1 hijo, y no aceptaban método anticonceptivo, a pesar de recibir la consejería durante el embarazo. Por otro lado, Mejia M. y Pinea R. en su estudio hallaron que el 59% de puérperas no presentaron alguna enfermedad que le impida utilizar MAC, de ellos solo 55,6 % no usara un anticonceptivo. Guardando similitud con la presente investigación.

CONCLUSIONES

PRIMERO: Al identificar los factores sociodemográficos que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos, en mayor porcentaje se encontró al estado civil conviviente y residencia urbana en un 63% (51) ambos, profesaban la religión católica el 60.5% (49), la ocupación ama de casa en el 58% (47), el grado de instrucción nivel secundario en el 43.2% (35) y la edad en el intervalo de 24 a 29 años en el 33.3% (27). De ellas solo el factor sociodemográfico influyente al rechazo de métodos anticonceptivos es el grado de instrucción con un $p_v = 0.010$.

SEGUNDO: Al indicar los factores institucionales que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos, en mayor porcentaje se halló, que el personal de salud ha tenido una actitud respetuosa y cordial en un 91.4% (74), recibieron información por el profesional de obstetricia después del parto en un 67,9%(55), distancia de su vivienda al hospital es un factor para no acudir al consultorio de planificación en un 64.2% (52), disponibilidad de todos los métodos anticonceptivos en un 63% (51) y finalmente el 55.6%(45) no sabían los horarios de atención del servicio de planificación familiar. Por tanto, el único factor institucional no influyente al rechazo de métodos anticonceptivos es la actitud respetuosa y cordial del personal de salud con un $p_v = 0.249$.

TERCERO: Al especificar los factores personales que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos, en mayor porcentaje se evidencio que el 77.8% (63) considera que usar métodos anticonceptivos después del parto es importante, el 72,8% (59) no escuchó algún mito o creencia sobre algún método anticonceptivo, el 71.6% (58) no considera que su pareja influye negativamente en el uso de métodos anticonceptivos, 54.3% (44) no tienen conocimiento de cómo actúan los métodos anticonceptivos en su cuerpo y por último el 50.6% (41) no presentó algún malestar al usar algún método anticonceptivo y les provocaron que lo dejara de usar. En cuanto a los factores personales todos son influyentes al rechazo a métodos anticonceptivos por tener un $p_v = <0.05$.

CUARTO: Al determinar los factores gineco-obstétricos que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos, en mayor porcentaje se observó que no presentaron complicaciones durante y después del parto que le impida utilizar algún método anticonceptivo en un 92.6% (75), el tipo de parto por cesárea en un 58% (47) y por último con relación al número de hijos de 2 a 5 en un 55.4% (45). En este caso, todos los factores gineco-obstétricos son influyentes al rechazo a métodos anticonceptivos por tener un $p_v = <0.05$.

QUINTO: con respecto a la contrastación de la hipótesis se usó la prueba estadística de chi cuadrado, concluyéndose que los factores influyentes al rechazo a métodos anticonceptivos fueron: factores sociodemográficos como el grado de instrucción ($p_v=0.010$); factores institucionales como la información brindada por el personal de obstetricia ($p_v=0.001$), disponibilidad de todos métodos anticonceptivos ($p_v=0.008$), el saber los horarios de atención del servicio de planificación familiar ($p_v=0.044$) y la distancia de la vivienda al hospital ($p_v=0.046$); los factores personales como influencia negativa de la pareja ($p_v=0.000$), seguido la importancia de usar métodos anticonceptivos después del parto ($p_v=0.000$), malestar al uso de algún método anticonceptivo ($p_v=0.001$), conocimientos sobre métodos anticonceptivos ($p_v=0.021$), y creencias o mitos sobre métodos anticonceptivos ($p_v=0.032$); los factores gineco-obstétricos como complicaciones durante o después del parto ($p_v=0.000$), tipo de parto ($p_v=0.003$), y número de hijos($p_v=0.032$); por tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

PRIMERO: A los profesionales de obstetricia realizar Intervenciones Educativas Considerando la influencia del grado de instrucción en el rechazo, se sugiere desarrollar programas de educación en salud sexual y reproductiva dirigidos especialmente a aquellos con niveles educativos más bajos. Estos programas podrían aumentar la comprensión de los métodos anticonceptivos y su importancia, lo que podría contribuir a reducir el rechazo.

SEGUNDO: A los establecimientos de salud es recomendable mejorar la comunicación con las puérperas en los servicios de planificación familiar. Esto podría incluir proporcionar información clara y detallada sobre todos los métodos disponibles destacando sus beneficios, considerando siempre los 5 pasos de la consejería, también brindarles información sobre los horarios de atención. Además de ello, considerar estrategias efectivas para llegar a aquellas personas que viven lejos del hospital ya que podría aumentar la accesibilidad al servicio de planificación familiar.

TERCERO: A los profesionales de obstetricia implementar campañas que deben enfocarse a mitigar conceptos erróneos, Esto podría involucrar la difusión de información precisa y basada en evidencia sobre los métodos anticonceptivos, destacando la importancia de su uso después del parto, así también brindar educación en el tema de la salud sexual y reproductiva a las parejas sobre la toma de decisiones compartida, fomentando la comunicación abierta y el entendimiento mutuo para ayudar a disminuir esta barrera.

CUARTO: Considerando que las complicaciones durante o después del parto influyen en el rechazo, se podría implementar una atención más personalizada y enfocada en la salud sexual y reproductiva para las mujeres que han experimentado complicaciones. Esto podría ayudar a abordar preocupaciones y temores específicos relacionados con la salud gineco-obstétrica. Así mismo continuar con la sensibilización a la población a fin de prevenir embarazos no deseados o embarazos de riesgo mayormente en las puérperas que tuvieron parto por cesárea y que tienen más de tres embarazos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Estrategias para la programación de la Planificación familiar posparto [internet].; 2014 [cited 2023 enero 13]. Available from: <https://www.fphighimpactpractices.org/es/briefs/planificacion-familiar-inmediatamente-posparto/>.
2. UNFPA Perú. Planificación familiar, por un mundo con iguales oportunidades [internet].; 2021 [cited 2023 enero 10]. Available from: <https://peru.unfpa.org/es/news/planificaci%C3%B3n-familiar-por-un-mundo-con-iguales-oportunidades>.
3. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de salud familiar [internet].; 2020 [cited 2023 enero 12]. Available from: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2020/INFORME_PRINCIPAL_2020/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2020.pdf.
4. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Huánuco. Encuesta Demográfica y de salud familiar [internet].; 2020 [cited 2023 enero 12]. Available from: <https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2020/departamentales/Endes10/pdf/Huanuco.pdf>.
5. Lorenzo C, Beatriz Y. Factores que influyen en el rechazo de métodos anticonceptivos en mujeres en edad reproductiva que asisten al Hospital regional Hermilio Valdizán Medrano 2016. tesis de pregrado. Huánuco: Universidad de Huánuco, Facultad de Obstetricia; 2016.
6. Johns Hopkins University. Prácticas de alto impacto en la planificación familiar. Planificación familiar inmediatamente posparto: Un aspecto clave en los cuidados tras el nacimiento [internet].; 2017 [cited 2023 enero 12]. Available from:

<https://www.fphighimpactpractices.org/es/briefs/planificacion-familiar-inmediatamente-posparto/>.

7. Torres A. Factores que influyen en el abandono de los métodos de planificación familiar en mujeres receptoras del programa. tesis. Quetzaltenango: Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias de la Salud; 2015.
8. Vázquez R, Ruiz D, García P, Almeida C. Determinantes del rechazo a la anticoncepción post-evento obstétrico en pacientes del Hospital De La Mujer Zacatecana. Revista electrónica semestral en Ciencias de la Salud. 2015; 1(6).
9. Vázquez R, De la Rosa G, López G, Méndez E, Reyes G, Alvarado J, et al. Factores que motivan a las mujeres en puerperio inmediato a rechazar los métodos anticonceptivos en un hospital de Veracruz México. South Florida Journal of Development. 2022; 3(1).
10. Analuisa E, Huilcapi A. Uso de anticoncepción en mujeres de la zona rural indígena. tesis. Ambato: Repositorio Universidad Técnica de Ambato , Facultad de Ciencias de la Salud; 2022.
11. Romo G, García G, Huerta L, Ponce A. Factores que influyen en la aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos en el puerperio. Ginecol. obstet. Méx. 2021 abril; 69(10).
12. Mendoza N. Uso de métodos anticonceptivos durante el puerperio en el área sanitaria de Oviedo. tesis de pregrado. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá; 2020.
13. Cano L, López A. Rechazo de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil en Vicente Guerrero, Teapa, Tabasco, México. Scielo. 2020 Enero-Abril, Mayo-Agosto; 1(2).

14. Cocom, N. Factores culturales que influyen en la aceptación de métodos de planificación familiar Cantón Pachipac, Nahualá Sololá, Guatemala. tesis de pregrado. Guatemala,,: Universidad Rafael Landivar; 2020.
15. Zaldivar A, al. e. Anticoncepción post evento obstétrico. Scielo. 2020; 36(3).
16. Ramírez J. Factores que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Hospital Regional del Cusco abril – julio del 2021. Tesis Pregrado. Cusco: Repositorio Digital Universidad Andina del Cusco , Facultad de Ciencias de la Salud ; 2021.
17. Sanchez S. Conocimiento y elección de métodos anticonceptivos posparto en puérperas mediatas del Centro de Salud Túpac Amaru, agosto – setiembre 2022. tesis. Lima: Universidad Privada del Norte, Facultad de Ciencias de la Salud; 2022.
18. Reyes M. Factores que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Hospital Rezola de cañete. Periodo: Enero - Marzo. tesis de pregrado. Lima: Universidad Privada Sergio Bernales; 2021.
19. Gadea M. Factores asociados al rechazo de uso de métodos anticonceptivos después del parto en el hospital de apoyo María Auxiliadora. tesis de pregrado. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2021.
20. Alvarado P. Factores sociales asociados a la no elección de método anticonceptivo en puérperas adolescentes. Hospital II-E Simón Bolívar. 2020. tesis. Cajamarca: Universidad Nacional de Cajamarca, Facultad de Ciencias de la Salud; 2020.
21. Mejía M, Pineda R. Factores asociados al no uso de métodos anticonceptivos durante el puerperio, Hospital Víctor Ramos Guardia –

- Huaraz. tesis de pregrado. Huaraz: Universidad Nacional Antúñez de Mayolo; 2019.
22. Celestino Dorival A. Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en el postparto. en pacientes atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unánue. tesis de pregrado. Lima: Universidad Nacional Federico Villareal; 2019.
23. Gomez C, Llallico Y. Nivel de conocimiento y actitudes que tienen las puérperas sobre métodos anticonceptivos en el Centro de Salud las Moras, Huánuco 2020. Tesis de Pregrado. Huánuco: Repositorio Institucional UNHEVAL, Facultad de Obstetricia Escuela Profesional de Obstetricia; 2022.
24. Hernández M, Huamani J. Factores socioculturales y familiares que influyen en la elección del método anticonceptivo de corta duración en puérperas atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha de julio - setiembre 2021. Tesis de Pregrado. Repositorio Institucional UNHEVAL, Facultad de Obstetricia Escuela Profesional de Obstetricia; 2022.
25. Zambrano J. Factores y actitudes frente al rechazo del dispositivo intrauterino en pacientes del Hospital Hermilio Valdizan Medrano de Huánuco. Tesis de Pregrado. Huánuco: Repositorio Institucional, Facultad de Ciencias de la Salud ; 2021.
26. Rivera L, Dominguez I. Nivel de conocimientos, actitudes y practica y su vinculo con el mal uso de los métodos anticonceptivos en puerperas en el hospital materno infantil Carlos Showing Ferrari. Tesis de Pregrado. Huánuco: Repositorio Institucional UNHEVAL , Facultad de Medicina Escuela Profesional de Medicina Humana ; 2020.
27. Garay M, Rojas G. Factores predisponentes a la no aceptación del bloqueo tubárico bilateral, Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano- Huánuco. tesis de pregrado. Huánuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizan; 2019.

28. Leiva Yaro A. Funcionalidad familiar y aceptación de métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Hermilio Valdizan Medrano de Huánuco. tesis doctoral. Huánuco: Universidad de Huánuco; 2019.
29. Tilio A. Sociocultural [internet].; 2020 [cited 2023 mayo 15. Available from: <https://designificados.com/sociocultural/>.
30. Rocha M, Ruiz L, Padilla N. Correlación entre factores socioculturales y capacidades de autocuidado en adulto maduro hipertenso en un área rural de México. Scielo. 2017 julio; 27(4).
31. Heras B, Gobernado J, Mora P, Almaraz A. La edad materna como factor de riesgo obstétrico. Resultados perinatales en gestantes de edad avanzada. Elsevier. 2011 noviembre; 54(11).
32. Instituto Nacional de Estadística. Concepto seleccionado: Ocupación [online].; 2021 [cited 2023 mayo 12. Available from: <https://www.ine.es/DEFIne/es/concepto.htm?c=4614&op=30451&p=2&n=20>.
33. Instituto Vasco de Estadística. Nivel de instrucción (7 grupos) [online].; 2022 [cited 2023 mayo 10. Available from: https://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_303/elem_11188/definicion.html#:~:text=El%20nivel%20de%20instrucci%C3%B3n%20de,est%C3%A1n%20provisional%20o%20definitivamente%20incompletos.
34. Parra S. Impacto de estrategia educativa que influye sobre factores socioculturales en aceptación de métodos anticonceptivos, Santa Rosa de Pichul 2015-2016. tesis magistral. Ambato: Universidad técnica de Ambato; 2016.
35. Real Academia Española (RAE). [internet].; 2022 [cited 2023 junio 23. Available from: <https://dle.rae.es/religi%C3%B3n>.

36. Campos C. Factores biosocioculturales y uso de métodos anticonceptivos en mujeres que acuden al Hospital Elpidio Berovidez Pérez, Otuzco 2014. tesis. Trujillo: Universidad Católica los Angeles de Chimbote, Facultad de Ciencias de la Salud; 2015.
37. Real Academia Española. Residencia habitual [online].; 2022 [cited 2023 mayo 10. Available from: <https://dpej.rae.es/lema/residencia-habitual#:~:text=1.,carezca%20de%20autorizaci%C3%B3n%20de%20residencia.>
38. Ruiz J. Influencia de la pareja en el uso del método anticonceptivo en puérperas del hospital San Jose De Chincha en el mes de julio – setiembre 2017.. tesis para optar el título profesional de licenciada en Obstetricia. Ica: Universidad Privada de Ica, Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias de la Salud ; 2018.
39. Gama N. Factores que influyeron en el abandono de métodos anticonceptivos en puerperas, atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho, noviembre - diciembre del 2015. tesis Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia. Lima – Perú : Universidad Nacional Mayor de san Marcos, Facultad de Medicina; 2016.
40. Clínic Barcelona. ¿Qué es el Parto? [internet].; 2022 [cited 2023 junio 25. Available from: [https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/embarazo-y-parto/parto.](https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/embarazo-y-parto/parto)
41. Pérez J, Merino M. Rechazo - Qué es, definición, en el deporte y en la medicina. [internet].; 2022 [cited 2023 julio 15. Available from: [https://definicion.de/rechazo/.](https://definicion.de/rechazo/)
42. Sanitas Seguros Médicos. Los métodos anticonceptivos [internet].; 2022 [cited 2023 mayo 10. Available from:

<https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/exploraciones-ginecologia/san041994wr.html>.

43. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Anticoncepción después del parto [internet].; 2022 [cited 2023 mayo 12. Available from: https://sego.es/mujeres/Anticoncepcion_puerperio.pdf.
44. Cigna. Métodos anticonceptivos de barrera [internet].; 2023 [cited 2023 mayo 03. Available from: <https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/mtodos-anticonceptivos-de-barrera-zm2456>.
45. Frances E. Anticonceptivos de barrera [online].; 2022 [cited 2023 mayo 10. Available from: <https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-femenina/planificaci%C3%B3n-familiar/anticonceptivos-de-barrera>.
46. Ferrer J. Definición de Factores [Internet]. Enciclopedia.net. [citado el 14 de enero de 2023]. Disponible en: <https://enciclopedia.net/factores/>. 2014..
47. Ministerio de Salud (MINSA). Norma técnica de salud de planificación familiar. [internet].; 2016 [cited 2023 mayo 2. Available from: https://sital.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/resolucion_ministerial_ndeg652-2016-minsa_norma_tecnica_de_planificacion_familiar.pdf.
48. Bezares B, Sanz O, Jiménez I. Patología puerperal. An. Sist. Sanit. Navar [Internet]. [citado el 14 de enero de 2023]; 32(1):169. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v32s1/obstetricia7.pdf>. 2009..
49. Fio Ferm. Anticonceptivos [Internet]. Flo.health - El producto móvil número 1 para la salud de la mujer. [citado el 22 de enero de 2023]. Disponible en: <https://flo.health/es/tu-ciclo/sexo/anticonceptivos>. 2015..

50. L. VG. Historia de la sexualidad. Imbiomed [Internet].1998 [citado el 22 de enero de 2023];9(2):116-121. Disponible en: <https://www.imbiomed.com.mx/articulo.php?id=20255..>
51. Somogyi L, Mora E. Métodos anticonceptivos: Entonces y ahora. Rev. Obstet Ginecol Venez. 2011;71(2):118–23..
52. Díaz Alonso G. Historia de la anticoncepción. Rev Cuba Med Gen Integral. 1995; 11(2).
53. Supo, J. Metodología de la investigación científica: Para las Ciencias de la Salud y las Ciencias Sociales. Tercera edición ed. Zacarías H, editor.: BIOESTADISTICO EIRL; 2020.
54. Beatriz Pineda E, Luz de Alvarado E, H de Canales F. Metodología de la investigación [Internet]. Washington: 2;1994. Disponible en: <http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodologia%20de%20la%20Investigacion%20Manual%2..>
55. Narvaez M. Método deductivo: Qué es y cuál es su importancia [Internet]. QuestionPro. 2022 [citado el 15 de enero de 2023]. Disponible en: [https://www.questionpro.com/blog/es/metodo-deductivo/..](https://www.questionpro.com/blog/es/metodo-deductivo/)
56. Centro de investigación en pólizas de salud de UCLA. Consideraciones éticas en investigaciones con seres humanos [Internet]. healthpolicy. [citado el 15 de enero del 2023]. Disponible en: https://healthpolicy.ucla.edu/programs/health-data-espanol/Documents/apendice_D_elaborando.pdf..
57. Facultad de Medicina y Hospital Universitario. Universidad Autónoma de Nuevo León. Subdirección de Investigación. [Online]. Available from: <https://www.medicina.uanl.mx/investigacion/wp-content/uploads/2019/05/21-codigo-de-nucc88remberg.pdf>.


58. Roncheros L. “Factores que influyen en la aceptación del uso de métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital San José De Chíncha, durante el periodo de setiembre a diciembre del 2019”. tesis de pregrado. Huánuco: Universidad Privada de Ica , Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias de la Salud; 2019.

ANEXOS

Anexo 01.

Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLES DIMENSIONES	METODOLOGÍA
<p>Problema general</p> <p>¿Cuáles son los factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari-Huánuco - Amarilis 2023?</p> <p>Problemas Específicos</p> <p>¿Cuáles son los factores sociodemográficos que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en</p>	<p>Objetivo General</p> <p>Conocer los factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari - Amarilis, 2023</p> <p>Objetivos Específicos</p> <p>Identificar los factores sociodemográficos que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del</p>	<p>Hipótesis general</p> <p>Hi: Los factores sociodemográficos, institucionales, personales, gineco-obstétricos influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p> <p>H0: Los factores sociodemográficos, institucionales, personales, gineco-obstétricos no influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p> <p>Hipótesis específicas</p> <p>HI1: Los factores sociodemográficos influyen en el rechazo a métodos</p>	<p>Variable Independiente:</p> <p>Factores</p> <p>Dimensiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sociodemográficos • Institucional • Personales • Gineco-obstétricos <p>Variable Dependiente:</p> <p>Rechazo a métodos anticonceptivos</p> <p>Dimensiones:</p>	<p>Tipo de Investigación:</p> <p>No experimental, prospectivo, transversal</p> <p>Nivel:</p> <p>Relacional</p> <p>Diseño:</p>

<p>puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023?</p> <p>¿Cuáles son los factores institucionales que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023?</p> <p>¿Cuáles son los factores personales que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023?</p> <p>¿Cuáles son los factores gineco-</p>	<p>Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p> <p>Indicar los factores institucionales que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023</p> <p>Especificar los factores personales que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p>	<p>anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p> <p>H01: Los factores sociodemográficos no influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p> <p>Hi2: Los factores institucionales influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos postparto en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p> <p>H02: Los factores institucionales no influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p> <p>Hi3: Los factores personales influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos</p>	<p>• Rechazo a MAC</p>	<p>Descriptivo correlacional</p>  <p>Donde:</p> <p>M: muestra</p> <p>X: variable de estudio 1</p> <p>Y: variable de estudio 2</p> <p>r: correlación</p>
---	--	---	------------------------	--

<p>obstétricos que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023?</p>	<p>Determinar los factores Gineco-obstétricos que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p>	<p>Showing Ferrari Huánuco - Amarilis, 2023.</p> <p>H03. Los factores personales no influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p> <p>Hi4: Los factores Gineco obstétricos influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p> <p>H04: Los factores Gineco obstétricos no influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco - Amarilis 2023.</p>		
--	---	--	--	--



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
FACULTAD DE OBSTETRICIA



Anexo N° 02

Consentimiento informado

La presente investigación que tiene por Título : “Factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco- amarilis 2023 “, realizado por las Bachilleres en Obstetricia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán: Timoteo Cori, Laura Thalía y Calderon Aliaga, Yadira Benita, tiene como objetivo determinar los factores que influyen en el rechazo a los métodos anticonceptivos postparto en mujeres que se encuentran hospitalizadas en el servicio de Puerperio.

Una vez autorizada su participación, la investigadora le brindara un cuestionario para que pueda responder las preguntas que contiene. Esto tomara aproximadamente unos 10 minutos de su tiempo.

Beneficios: La institución obtendrá información valiosa e importante sobre el tema en estudio, lo cual posteriormente servirá como referencia para mejorar las estrategias en atención posparto.

Confidencialidad: Los datos obtenidos a lo largo del presente estudio son totalmente confidenciales, de modo que sólo se emplearan para cumplir los objetivos antes descritos.

Costos e incentivos: El presente estudio no supone ningún costo, incentivo económico o retribución material derivado de la participación ni para usted, ni para la institución.

Problemas o preguntas: Si usted tuviera alguna pregunta podrá hacerla al profesional que realizara la entrevista; si luego de ser entrevistada quisiera no participar en el estudio comuníquese con el investigador para cualquier consulta o retiro del estudio.

Participación voluntaria: Su negativa a participar no afectara los servicios que usted precise durante su estancia en la institución.

Declaración del paciente

He leído y he entendido la información escrita en esta hoja y firmo este documento autorizando mi participación en el estudio, con esto no hay renuncia mía a nuestro derecho como pacientes o ciudadanos. Comprendo que el resultado de la investigación será presentado a la comunidad científica para mejor comprensión en condiciones de anonimato.

Firma del participante

Firma de la investigadora

Firma de la investigadora

Timoteo Cori, Laura

Calderon Aliaga, Yadira



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
FACULTAD DE OBSTETRICIA
Anexo N° 03



CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Título de la investigación: “Factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Huánuco- Amarilis 2023”

Instrucciones: si usted decide ser partícipe del estudio, podrá retirarse de este en cualquier momento, sin perjuicio alguno. A continuación, encontrará una serie de preguntas anónimas con sus respectivas alternativas lo cual deberá marcar un aspa (x) en el ítem que usted crea conveniente a su respuesta. Los datos obtenidos por su persona, no serán divulgados y serán utilizadas exclusivamente para la investigación. Ya que esta investigación será beneficiosa para usted impartándole conocimientos científicos acerca de los métodos anticonceptivos, y Si tuviese alguna duda adicional acerca del estudio, no dude en realizarlo.

Muchas gracias

Código:

Fecha: / /

I. FACTORES

a. Factores Sociodemográficos

1. ¿Qué edad tienes?
 - a) <18 años
 - b) 18-23 años
 - c) 24-29 años
 - d) 30-35 años
 - e) >35 años
2. ¿Qué ocupación tiene?
 - a) Ama de casa
 - b) Estudiante
 - c) Trabajo Independiente
 - d) Empleado
3. ¿Cuál es su grado de instrucción?
 - a) Sin instrucción
 - b) Primaria

- c) Secundaria
 - d) Superior
4. ¿Cuál es su estado civil?
- a) Soltera
 - b) Conviviente
 - c) Casada
5. ¿Cuál es tu religión ?
- a) Católica
 - b) Evangélica
 - c) Otros -----
6. ¿Cuál es su lugar de procedencia?
- a) Urbano
 - b) Rural

b. Factores Institucionales

7. ¿Usted recibió información por parte del profesional de obstetricia sobre métodos anticonceptivos después del parto?
- a) Si
 - b) No
8. ¿Considera Ud. que el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari dispone de todos los de métodos anticonceptivos?
- a) Si
 - b) No
9. ¿ El personal de obstetricia mantuvo en todo momento un trato respetuosa y cordial?
- a) Si
 - b) No
10. Considera Ud. que la distancia de su vivienda al hospital es un factor para no acudir al consultorio de planificación familiar ?
- a) Si
 - b) No

11. ¿usted sabe los horarios de atención del servicio de planificación familiar?

- a) Si
- b) no

c. Factores Personales

12. ¿Cree Ud. que su pareja influye negativamente en el uso de métodos anticonceptivos?

- a) Si
- b) No

13. ¿Usted presento algún malestar al usar algún método anticonceptivo y que haya provocado que lo dejara de usar?

- a) Si
- b) No

14. ¿Usted tiene conocimiento de cómo actúan los métodos anticonceptivos en su cuerpo?

- a) Si
- b) No

15. ¿Escuchó algún mito o creencia sobre algún método anticonceptivo?

- a) Si
- b) No

16. Considera Usted que usar métodos anticonceptivos después del parto es importante?

- a) Si
- b) No

d. Factores gineco-obstétricos

17. ¿El tipo de parto que usted tuvo fue:

- a) Parto Vaginal
- b) Parto por cesárea

18. ¿Cuántos hijos tiene?

- a) 1
- b) 2 a 5
- c) >5

19. ¿Usted tuvo complicaciones durante y después del parto que le impida utilizar algún Método anticonceptivo?

- a) Si
- b) No

II. RECHAZO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

20. ¿Usted eligió algún método anticonceptivo después del parto?

- a) Si
- b) No

Anexo N° 04

Tabla 08. Prueba de Chi cuadrado de los factores sociodemográficos y rechazo a métodos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Factores sociodemográficos Rechazo a métodos anticonceptivos	Chi²	GI	Significancia o P valor
Edad	4.269	4	0.371
Ocupación	4.222	3	0.238
Grado de instrucción	11.357	3	0.010
Residencia	0.369	2	0.831
Estado civil	1.035	2	0.596
Religión	0.552	1	0.458

interpretación

En la tabla 08 al describir el análisis los factores sociodemográficos y el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado se halló, que el único factor que influye es el grado de instrucción con valor Chi² = 11.357 y p valor = 0.010; en tanto la edad, ocupación, residencia, estado civil y religión no se asocia a la aceptación o rechazo de los métodos anticonceptivos puesto a que presentaron un p valor > a 0.05.

Anexo N° 05

Tabla 09. Prueba de Chi cuadrado de los factores institucionales y rechazo a métodos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Factores institucionales Rechazo a métodos anticonceptivos	Chi²	GI	Significancia o P valor
Recibió información por parte del profesional de obstetricia sobre métodos anticonceptivos después del parto	12.280	1	0.001
Considera Ud. que el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari dispone de todos los de métodos anticonceptivos	11.328	1	0.008
El personal de salud mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial	1.328	1	0.249
Considera que la distancia de su vivienda al hospital es un factor para no acudir al consultorio de planificación para recibir su método anticonceptivo	9.698	1	0.046
Usted sabe los horarios de atención del servicio de planificación familiar	9.026	1	0.044

Interpretación: En la tabla 09 al describir los factores institucionales y el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado se halló, que existen factores que si influyen al rechazo, en ello quien más se influye es la información por parte del profesional de obstetricia sobre métodos anticonceptivos después del parto con valor Chi² =12.280 y p valor = 0.001, seguido de disposición de todos los de métodos anticonceptivos con valor Chi² =11.328 y p valor = 0.008, también el saber los horarios de atención del servicio de planificación familiar Chi² =9.026 y p valor = 0.044 y finalmente la distancia de su vivienda al hospital es un factor para no acudir al consultorio de planificación para recibir su método anticonceptivo Chi² =9.698 y p valor = 0.046.

Anexo N° 06

Tabla 10. Prueba de Chi cuadrado de los factores personales y rechazo a métodos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Factores personales Rechazo a métodos anticonceptivos	Chi²	GI	Significancia o P valor
Cree usted que su pareja influye negativamente en el uso de métodos anticonceptivos	13.156	1	0.000
Usted presento algún malestar al usar algún método anticonceptivo y que haya provocado que lo dejara de usar	12.149	1	0.001
Usted tiene conocimiento de cómo actúan los métodos anticonceptivos en su cuerpo	9.359	1	0.021
Escuchó algún mito o creencia sobre algún método anticonceptivo	8.994	1	0.032
Considera que usar métodos anticonceptivos después del parto es importante	12.178	1	0.000

interpretación

En la tabla 10 al describir el análisis de los factores personales y el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado se halló, que los factores personales que influyen al rechazo, en ello quien más influye son los que considera que su pareja tiene una influencia negativa ante el uso de métodos anticonceptivos $Chi^2 = 13.156$ y p valor = 0.000, seguido de la importancia de usar métodos anticonceptivos después del parto $Chi^2 = 12.178$ y p valor = 0.000, del mismo modo los que presentaron algún malestar al usar algún método anticonceptivo y que haya provocado que lo dejara de usar $Chi^2 = 12.149$ y p valor = 0.001, luego los que tienen conocimiento de cómo actúan los métodos anticonceptivos en su cuerpo $Chi^2 = 9.359$ y p valor = 0.021 y escuchar algún mito o creencia sobre algún método anticonceptivo $Chi^2 = 8.994$ y p valor = 0.032.

Anexo N° 07

Tabla 11. Prueba de Chi cuadrado de los factores gineco-obstétricos y rechazo a métodos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” Huánuco - Amarilis 2023.

Factores gineco-obstétricos Rechazo a métodos anticonceptivos	Chi²	Gl	Significancia o P valor
Tipo de parto	10.051	1	0.003
Número de hijos	9.890	1	0.032
Complicaciones durante y después del parto que le impida utilizar algún Método anticonceptivo	12.467	1	0.000

Interpretación

En la tabla 11 al describir el análisis de los factores gineco-obstétricos y el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del hospital materno infantil “Carlos Showing Ferrari” mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado se halló, que los factores gineco-obstétricos influyen al rechazo, en ello quien más influye son el presentaron complicaciones durante y después del parto que le impida utilizar algún Método anticonceptivo $Chi^2 = 12.467$ y p valor = 0.000, seguido del tipo de parto $Chi^2 = 10.051$ y p valor = 0.003; y finalmente el número de hijos $Chi^2 = 9.890$ y p valor = 0.032.

Anexo N° 08

Solicitud de encuesta



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
FACULTAD DE OBSTETRICIA

Huánuco, 27 de Abril de 2023

Carta N° 01- 2023-FOBST-UNHEVAL

Sr(a):
Lic. Yuli Daga Caycho

DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI

ASUNTO: SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

De mi mayor consideración.
Previo un cordial saludo, es grato dirigirme a usted para solicitar la autorización correspondiente para la ejecución del proyecto de tesis que tiene por título: "FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A METODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "CARLOS SHOWING FERRARI" HUANUCO - AMARILIS 2023" con fines académicos y de investigación, lo cual consistirá en la aplicación de un cuestionario a las puérperas hospitalizadas en dicha institución. Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de estima y consideración.

Adjunto copia del proyecto en CD.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de estima y consideración.

Atentamente,


Bach. Laura T. Timoteo Cori
FACULTAD DE OBSTETRICIA
C.c.
Archivo


T. No. 01..... Folio:.....
Fecha: 27 ABR 2023
D. No. 050
Bach. Yedra B. Calderon Aliaga
FACULTAD DE OBSTETRICIA



PROVEIDO N° 23 -23-CCHMICSF.

Visto la solicitud presentada por Timoteo Cori Laura, para recolección de datos en el Proyecto de Investigación, "Factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en púerperas del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari Amarilis 2023, y en atención al convenio marco vigente entre la Universidad Hermilio Valdizan – Facultad de Obstetricia, la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación opina **PROCEDENTE** lo solicitado, se hace de su conocimiento y autorización para recojo de datos a partir de la fecha, así mismo se le solicita informar al término del mismo los resultados para contar una base de información en nuestra institución.

Es cuanto informo a las interesadas para trámite correspondiente.

Amarilis, 03 de Mayo de 2023



Luis A. Laguna Arias
Luis A. Laguna Arias
Ent. Esp. Pediatría
C.E.P. 16888 REE 11477

Anexo 09

Validación por expertos

ESCALA DICOTOMICA PARA VALIDAR INSTRUMENTOS

OPINION DE JUECES REVISORES

TITULO DE LA INVESTIGACION: "Factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos

Showing Ferrari Huánuco –Amarilis 2023".

JUEZ REVISOR: *D. Fredy Aguilar Guerrero*

CRITERIOS DE EVALUACION	CORRECTO 2 PUNTOS	INCORRECTO 0 PUNTOS
1. El instrumento da cuenta del título/ tema y lo expresa con claridad y pertinencia.	2	
2. El instrumento tiene estructura lógica.	2	
3. La secuencia de presentación es óptima.	2	
4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable.	2	
5. Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles.	2	
6. Los reactivos (operacionalización de variables) reflejan las fases de la elaboración del proyecto de investigación.	2	
7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operacionalización de variables del proyecto de investigación	2	
8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos	2	
9. Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación	2	
10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio.	2	
TOTAL	20	

OBSERVACIONES:

Fredy Aguilar Guerrero
MEDICINA GINECÓLOGA OBSTETRA
CIP 54192 RNE 46507 DN: 41693990
FIRMA DEL EXPERTO

ESCALA DICOTOMICA PARA VALIDAR INSTRUMENTOS

OPINION DE JUECES REVISORES

TITULO DE LA INVESTIGACION: "Factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos

Showing Ferrari Huánuco -Amarilis 2023".

JUEZ REVISOR: la Sra. Escobar Porras.....

CRITERIOS DE EVALUACION	CORRECTO 2 PUNTOS	INCORRECTO 0 PUNTOS
1. El instrumento da cuenta del título/ tema y lo expresa con claridad y pertinencia.	2	
2. El instrumento tiene estructura lógica.	2	
3. La secuencia de presentación es óptima.	2	
4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable.	2	
5. Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles.	2	
6. Los reactivos (operacionalización de variables) reflejan las fases de la elaboración del proyecto de investigación.	2	
7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operacionalización de variables del proyecto de investigación	2	
8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos	2	
9. Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación	2	
10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio.	2	
TOTAL	20	

OBSERVACIONES:



Sara C. Escobar Porras
OBSTETRA
COP. 19527

DN 22505270

FIRMA DEL EXPERTO

ESCALA DICOTOMICA PARA VALIDAR INSTRUMENTOS

OPINION DE JUECES REVISORES

TITULO DE LA INVESTIGACION: "Factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos

Showing Ferrari Huánuco –Amarilis 2023".

JUEZ REVISOR: *Parodei Rojas Jorge Luis*

CRITERIOS DE EVALUACION	CORRECTO 2 PUNTOS	INCORRECTO 0 PUNTOS
1. El instrumento da cuenta del título/ tema y lo expresa con claridad y pertinencia.	2	
2. El instrumento tiene estructura lógica.	2	
3. La secuencia de presentación es óptima.	2	
4.El grado de complejidad de los ítems es aceptable.	2	
5.Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles.	2	
6.Los reactivos (operacionalización de variables) reflejan las fases de la elaboración del proyecto de investigación.	2	
7.El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operacionalización de variables del proyecto de investigación	2	
8.Las preguntas permiten el logro de los objetivos	2	
9.Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación	2	
10.Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio.	2	
TOTAL	20	

OBSERVACIONES:

Dr. Jorge Luis Parodei Rojas
Ginecología y Obstetricia
M.B. 36900 RNE. 034356
FIRMA DEL EXPERTO DNI: 32920475

ESCALA DICOTOMICA PARA VALIDAR INSTRUMENTOS

OPINION DE JUECES REVISORES


TITULO DE LA INVESTIGACION: Factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil "Carlos

Showing Ferrari" Huánuco - 2023

JUEZ REVISOR: Gabriela Pilar Cabrera Martínez

CRITERIOS DE EVALUACION	CORRECTO 2 PUNTOS	INCORRECTO 0 PUNTOS
1. El instrumento da cuenta del título/ tema y lo expresa con claridad y pertinencia.	2	
2. El instrumento tiene estructura lógica.	2	
3. La secuencia de presentación es óptima.	2	
4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable.	2	
5. Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles.	2	
6. Los reactivos (operacionalización de variables) reflejan las fases de la elaboración del proyecto de investigación.	2	
7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operacionalización de variables del proyecto de investigación	2	
8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos	2	
9. Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación	2	
10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio.	2	
TOTAL	20	

OBSERVACIONES:


 Gabriela P. Cabrera Martínez
 FIRMA DEL EXPERTO
 COP. 18948
 10090905

ESCALA DICOTOMICA PARA VALIDAR INSTRUMENTOS

OPINION DE JUECES REVISORES

TITULO DE LA INVESTIGACION: "Factores que influyen en el rechazo a métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital Materno Infantil Carlos

Showing Ferrari Huánuco –Amarilis 2023".

JUEZ REVISOR: OBSTETRA: NEOMI YOLANDA ALVARADO VICENTE

CRITERIOS DE EVALUACION	CORRECTO 2 PUNTOS	INCORRECTO 0 PUNTOS
1. El instrumento da cuenta del título/ tema y lo expresa con claridad y pertinencia.	2	
2. El instrumento tiene estructura lógica.	2	
3. La secuencia de presentación es óptima.	2	
4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable.	2	
5. Los términos utilizados en las preguntas son claros y comprensibles.	2	
6. Los reactivos (operacionalización de variables) reflejan las fases de la elaboración del proyecto de investigación.	2	
7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la operacionalización de variables del proyecto de investigación	2	
8. Las preguntas permiten el logro de los objetivos	2	
9. Las preguntas permiten recoger la información para alcanzar los objetivos de la investigación	2	
10. Las preguntas están agrupadas de acuerdo a las dimensiones del estudio.	2	
TOTAL	20	

OBSERVACIONES:



FIRMA DEL EXPERTO

Anexo N° 10
Galería fotográfica





Anexo N° 11

Nota biográfica



CALDERON ALIAGA YADIRA

BENITA

DATOS PERSONALES

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1.1 Nombres y Apellidos | : Yadira Benita Calderón Aliaga |
| 1.2 Documento Nacional de Identidad | : 73588917 |
| 1.3 Fecha de nacimiento | : 05 de noviembre |
| 1.4 Lugar de nacimiento | : Huánuco-Huánuco-Huánuco |
| 1.5 Teléfono | : 924594030 |
| 1.6 Correo | : yadicalderonaliaga@gmail.com |

FORMACION ACADEMICA

- 2.1 Educación primaria
 - G.U..E “Leoncio Prado”
- 2.2 Educación secundaria
 - I. E. E “Nuestra Señora de las Mercedes”
- 2.3 Grados y títulos
 - Bachiller en Obstetricia “Universidad Nacional Hermilio Valdizán

OTROS ESTUDIOS

- Idioma Extranjero Ingles Básico “Universidad Nacional Hermilio Valdizán”



Nota biográfica

TIMOTEO CORI, LAURA THALIA

DATOS PERSONALES

- 1.4 Nombres y Apellidos** : Laura Thalia Timoteo Cori
1.5 Documento Nacional de Identidad : 73637673
1.6 Fecha de nacimiento : 08 de marzo
1.4 Lugar de nacimiento : Huánuco-Huánuco-Huánuco
1.7 Teléfono : 945321802
1.8 Correo : lautico99@gmail.com

FORMACION ACADEMICA

- 2.4 Educación primaria**
- G.U.E “Leoncio Prado”
- 2.5 Educación secundaria**
- I. E. E “Nuestra Señora de las Mercedes”
- 2.6 Grados y títulos**
- Bachiller en Obstetricia “Universidad Nacional Hermilio Valdizán”

OTROS ESTUDIOS

- Idioma Extranjero Ingles Básico “Universidad Nacional Hermilio Valdizán”
- Ofimática Básica “Universidad Nacional Hermilio Valdizán”



FACULTAD DE OBSTETRICIA
Dirección de la Unidad de Investigación

Constancia N° 43-2023- DuI -FObst-UNHEVAL.

Dra. Ibeth Figueroa Sánchez
Decana de la Facultad de obstetricia

Ref. Proveído digital N° 442-2023-UNHEVAL/FObst-D.

Directora de la Unidad de Investigación - Facultad de Obstetricia
Dra. María del Pilar Melgarejo Figueroa

CONSTANCIA DE APTO

La unidad de Investigación de la Facultad de obstetricia emite la presente constancia de Anti-plagio, aplicando programa TURNITIN, la cual reporta 19%.

Estudiante: CALDERON ALIAGA YADIRA BENITA
TIMOTEO CORI LAURA THALIA

Tema: "FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI HUÁNUCO - AMARILIS 2023"

Asesoría: Dra. QUIÑONES FLORES, Mitsi Marleni

Fecha: 22.AGO.2023.

Atentamente,


Dra. C.S. María del Pilar Melgarejo Figueroa
Directora de la Unidad de Investigación
Facultad de Obstetricia

NOMBRE DEL TRABAJO

"FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS DEL HOSPITAL MATERNOL"

AUTOR

CALDERON ALIAGA, Yadira Benita TIMOTEO CORI, Laura Thalia

RECUENTO DE PALABRAS

23710 Words

RECUENTO DE CARACTERES

135667 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

129 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

2.1MB

FECHA DE ENTREGA

Aug 22, 2023 10:09 AM GMT-5

FECHA DEL INFORME


Aug 22, 2023 10:11 AM GMT-5**● 19% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 18% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 7% Base de datos de trabajos entregados
- 1% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Coincidencia baja (menos de 15 palabras)
- Material citado



Dra. C.S. María del Pilar Melgarejo Figueroa
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE OBSTETRICIA



**FACULTAD DE OBSTETRICIA
DECANATO**

RESOLUCIÓN N° 0512-2023-UNHEVAL/FObst-D

Huánuco, 22 de agosto de 2023.

VISTO:

La Solicitud S/N°, de fecha de 22.AGO.2023, presentada por las bachilleres Laura Thalia TIMOTEO CORI y Yadira Benita CALDERON ALIAGA, con nueve (09) folios, quienes solicitan fijar fecha y hora para la sustentación de su tesis;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 519-2022-UNHEVAL/FObst-D, de fecha 02.DIC.2022, se resuelve aprobar la Exclusividad del Título del Proyecto de Investigación: "FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A METODOS ANTICONCEPTIVOS POSTPARTO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI. HUÁNUCO. 2023", de las ex alumnas Laura Thalia TIMOTEO CORI y Yadira Benita CALDERON ALIAGA y se nombra a la Dra. Mary Luisa Maque Ponce, como Asesora de Tesis de las ex alumnas indicadas;

Que, mediante Resolución N° 059-2023-UNHEVAL/FObst-D, de fecha 24.FEB.2023, se modifica la Exclusividad del Título del Proyecto de Investigación debiendo ser: "FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI" HUANUCO – AMARILIS 2023" de las ex alumnas Laura Thalia TIMOTEO CORI y Yadira Benita CALDERON ALIAGA;

Que, mediante Resolución N° 161-2023-UNHEVAL/FObst-D, de fecha 21.ABR.2023, se designa Jurado de Tesis de las ex alumnas Laura Thalia TIMOTEO CORI y Yadira Benita CALDERON ALIAGA, quedando conformado el Jurado de Tesis por: Presidenta: Dra. Mónica Roxana TAMAYO GARCÍA, Secretaria: Dra. Jessye Mirtha RAMOS GARCIA, Vocal: Julio Constantino TUEROS ESPINOZA y Accesitaria: Dra. Zoila Elvira MIRAVAL TARAZONA;

Que, mediante Resolución N° 0177-2023-UNHEVAL/FObst-D, de fecha 28.ABR.2023, se aprueba el Proyecto de Tesis titulada: "FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI" HUANUCO – AMARILIS 2023", de las ex alumnas Laura Thalia TIMOTEO CORI y Yadira Benita CALDERON ALIAGA;

Que, con Resolución N° 0329-2023-UNHEVAL/FObst-D, de fecha 15.JUN.2023, con el 1° numeral se modifica la Resolución N° 519-2022-UNHEVAL/FObst-D, de fecha 02.DIC.2022, en el extremo de la designación de la asesoría de tesis y con 2° numeral se NOMBRA a la Dra. Mitsi Marleni QUIÑONES FLORES, como Asesora de Tesis de las bachilleres Laura Thalia TIMOTEO CORI y Yadira Benita CALDERON ALIAGA, para la orientación y asesoramiento en la continuación del proceso del desarrollo de la tesis mencionada;

Que, con INFORME N° 17-JMRG-JT-FOBST/UNHEVAL-2023, de fecha 11.JUL.2023, Dra. Jessye Mirtha RAMOS GARCÍA; con INFORME N° 016-2023-JTE-MJT-FO-UNHEVAL, de fecha 17.JUL.2023, Dr. Julio Constantino TUEROS ESPINOZA y con OFICIO VIRTUAL N° 50-D-MRTG-UNHEVAL-2023, de fecha 10.AGO.2023, Dra. Mónica Roxana TAMAYO GARCÍA, indican que después de haber realizado la revisión de dicha tesis se encuentra APTO para ser sustentada, dado que se ajusta a lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos de la UNHEVAL;

Que, de conformidad al Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, aprobado mediante Resolución Consejo Universitario N° 3412-2022-UNHEVAL, de fecha 24 de octubre de 2022, en el Título III, de la Modalidad de Tesis, en su art. 44°, señala: "Una vez que los miembros del Jurado de Tesis informen al Decano acerca de la suficiencia del trabajo de tesis para su sustentación, el interesado presentará una solicitud dirigida al Decano(a) pidiendo se fije lugar, fecha y hora para el acto de sustentación"; y en el Art° 80, menciona: "Concluido el proceso de Sustentación el Jurado informa al Decano sobre el resultado de la sustentación, remitiendo el acta correspondiente";

Que, con Resolución Consejo Universitario N°2939-2022-UNHEVAL, de fecha 12.SET.2022, resuelve: DISPONER que los decanos de las 14 facultades de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco programen, A PARTIR DE LA FECHA, la sustentación de tesis de pregrado de manera presencial;

Estando a las atribuciones conferidas a la Señora Decana de la Facultad de Obstetricia, mediante RESOLUCIÓN N° 077-2020-UNHEVAL- CEU, de fecha 11 de diciembre de 2020.

...///



FACULTAD DE OBSTETRICIA
DECANATO

...//RESOLUCIÓN° 0512-2023-UNHEVAL/FOBST-D

-2-

SE RESUELVE:

- 1° **DECLARAR** expedito a las bachilleres Laura Thalia TIMOTEO CORI y Yadira Benita CALDERON ALIAGA, para la sustentación de tesis.
- 2° **FIJAR** fecha, hora, lugar para la sustentación de la Tesis titulada: **"FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI HUÁNUCO – AMARILIS 2023"**, de las bachilleres Laura Thalia TIMOTEO CORI y Yadira Benita CALDERON ALIAGA, de la Facultad de Obstetricia, Carrera Profesional de Obstetricia, ante los Jurados de Tesis; por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
DÍA : Viernes, 25 de agosto de 2023.
HORA : 04:30 p.m
LUGAR : Auditorium de la Facultad de Obstetricia
- 3° **COMUNICAR** a los miembros del Jurado de Tesis y Asesora de Tesis, estando conformado de la siguiente manera:
Presidente : Dra. Mónica Roxana TAMAYO GARCÍA
Secretaria : Dra. Jessye Mirtha RAMOS GARCIA
Vocal : Dr. Julio Constantino TUEROS ESPINOZA
Accesitaria : Dra. Zoila Elvira MIRAVAL TARAZONA

Asesor : Dra. Mitsi Marleni QUIÑONES FLORES
- 4° **DISPONER** que los miembros del Jurado de Tesis designados deberán ceñirse a lo estipulado en el Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL.
- 5° **DAR A CONOCER** a las instancias correspondientes y a las interesadas.

Regístrese, comuníquese y archívese.


UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
FACULTAD DE OBSTETRICIA
Dra. Ibeth C. Figueroa Sanchez
DECANA

DISTRIBUCIÓN:

DUIFObst, Jurados, Asesora, Interesadas, Archivo.



FACULTAD DE OBSTETRICIA

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

En la ciudad Universitaria, en el distrito de Pillcomarca-Huánuco; siendo las 04:30 p.m., del día viernes 25 de agosto de 2023, en el auditorio de la Facultad de Obstetricia (Sala de sustentaciones), de acuerdo al Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, la bachiller **Yadira Benita CALDERON ALIAGA**, procedió al acto de Defensa de su Tesis titulado: **"FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI HUÁNUCO - AMARILIS 2023"**; ante los miembros del Jurado de Tesis, estando conformado por los siguientes docentes:

Presidente : Dra. Mónica Roxana TAMAYO GARCÍA
 Secretaria : Dra. Jessye Mirtha RAMOS GARCIA
 Vocal : Dr. Julio Constantino TUEROS ESPINOZA

Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del jurado y público. Se dio por concluido el acto de defensa de tesis; donde cada miembro del Jurado procedió a calificar.

Asimismo, el Jurado planteó a la tesis las siguientes observaciones:

.....

Obteniendo en consecuencia la nota cuantitativa de: *dieciséis* (*16*) y cualitativa de: *bueno*, por lo que se declara *aprobado*
 (Aprobado o desaprobada)

Los miembros del Jurado, firman la presente ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo las *17³⁵* horas del día 25 de agosto de 2023.

 Dra. Mónica Roxana TAMAYO GARCÍA
 PRESIDENTE

 Dra. Jessye Mirtha RAMOS GARCIA
 SECRETARIA

 Dr. Julio Constantino TUEROS ESPINOZA
 VOCAL

Asesora de tesis: Dra. Mitsi Marleni QUIÑONES FLORES

Leyenda:
 Excelente: 19 y 20
 Muy bueno: 17 y 18
 Bueno: 14 a 16
 Desaprobado: < 14



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

Huánuco - Perú

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°099-2019-SUNEDU/CD



FACULTAD DE OBSTETRICIA

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

En la ciudad Universitaria, en el distrito de Pillcomarca-Huánuco; siendo las 04:30 p.m., del día viernes 25 de agosto de 2023, en el auditorio de la Facultad de Obstetricia (Sala de sustentaciones), de acuerdo al Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, la bachiller **Laura Thalia TIMOTEO CORI**, procedió al acto de Defensa de su Tesis titulado: **"FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI HUÁNUCO - AMARILIS 2023"**; ante los miembros del Jurado de Tesis, estando conformado por los siguientes docentes:

Presidente : Dra. Mónica Roxana TAMAYO GARCÍA
 Secretaria : Dra. Jessye Mirtha RAMOS GARCIA
 Vocal : Dr. Julio Constantino TUEROS ESPINOZA

Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del jurado y público. Se dio por concluido el acto de defensa de tesis; donde cada miembro del Jurado procedió a calificar.

Asimismo, el Jurado planteó a la tesis las siguientes observaciones:

.....

Obteniendo en consecuencia la nota cuantitativa de: dieciséis (16) y cualitativa de: bueno, por lo que se declara aprobado (Aprobado o desaprobada)

Los miembros del Jurado, firman la presente ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo las 17³⁵ horas del día 25 de agosto de 2023.

 Dra. Mónica Roxana TAMAYO GARCÍA
 PRESIDENTE

 Dra. Jessye Mirtha RAMOS GARCIA
 SECRETARIA

 Dr. Julio Constantino TUEROS ESPINOZA
 VOCAL

Asesora de tesis: Dra. Mitsi Marleni QUIÑONES FLORES

Leyenda:
 Excelente: 19 y 20
 Muy bueno: 17 y 18
 Bueno: 14 a 16
 Desaprobado: < 14

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR UN GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL

1. Autorización de Publicación: (Marque con una "X")

Pregrado	X	Segunda Especialidad		Posgrado:	Maestría		Doctorado
----------	---	----------------------	--	-----------	----------	--	-----------

Pregrado (tal y como está registrado en SUNEDU)

Facultad	OBSTETRICIA
Escuela Profesional	OBSTETRICIA
Carrera Profesional	OBSTETRICIA
Grado que otorga	-----
Título que otorga	OBSTETRA

Segunda especialidad (tal y como está registrado en SUNEDU)

Facultad	-----
Nombre del programa	-----
Título que Otorga	-----

Posgrado (tal y como está registrado en SUNEDU)

Nombre del Programa de estudio	-----
Grado que otorga	-----

2. Datos del Autor(es): (Ingrese todos los datos requeridos completos)

Apellidos y Nombres:	CALDERON ALIAGA YADIRA BENITA						
Tipo de Documento:	DNI	X	Pasaporte		C.E.	Nro. de Celular:	924594030
Nro. de Documento:	73588917				Correo Electrónico:	yadicalderonaliaga@gmail.com	

Apellidos y Nombres:	TIMOTEO CORI LAURA THALIA						
Tipo de Documento:	DNI	X	Pasaporte		C.E.	Nro. de Celular:	945321802
Nro. de Documento:	73637673				Correo Electrónico:	lautico99@gmail.com	

Apellidos y Nombres:							
Tipo de Documento:	DNI		Pasaporte		C.E.	Nro. de Celular:	
Nro. de Documento:					Correo Electrónico:		

3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor)

¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?: (marque con una "X" en el recuadro del costado, según corresponda)	SI	x	NO				
Apellidos y Nombres:	QUIÑONES FLORES MITSI MARLENI			ORCID ID:	https://orcid.org/ 0000 - 0001-6875-2944		
Tipo de Documento:	DNI	X	Pasaporte		C.E.	Nro. de documento:	22475878

4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Jurado)

Presidente:	TAMAYO GARCÍA MÓNICA ROXANA
Secretario:	RAMOS GARCIA JESSYE MIRTHA
Vocal:	TUEROS ESPINOZA JULIO CONSTANTINO
Vocal:	
Vocal:	
Accesitario	MIRAVAL TARAZONA ZOILA ELVIRA

5. Declaración Jurada: (Ingrese todos los datos requeridos completos)

a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: (Ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación)	
"FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECHAZO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI HUÁNUCO - AMARILIS 2023"	
b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU)	
TITULO PROFESIONAL DE OBSTETRA	
c) El Trabajo de investigación no contiene plagio (ninguna frase completa o párrafo del documento corresponde a otro autor sin haber sido citado previamente), ni total ni parcial, para lo cual se han respetado las normas internacionales de citas y referencias.	
d) El trabajo de investigación presentado no atenta contra derechos de terceros.	
e) El trabajo de investigación no ha sido publicado, ni presentado anteriormente para obtener algún Grado Académico o Título profesional.	
f) Los datos presentados en los resultados (tablas, gráficos, textos) no han sido falsificados, ni presentados sin citar la fuente.	
g) Los archivos digitales que entrego contienen la versión final del documento sustentado y aprobado por el jurado.	
h) Por lo expuesto, mediante la presente asumo frente a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan (en adelante LA UNIVERSIDAD), cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por la autoría, originalidad y veracidad del contenido del Trabajo de Investigación, así como por los derechos de la obra y/o invención presentada. En consecuencia, me hago responsable frente a LA UNIVERSIDAD y frente a terceros de cualquier daño que pudiera ocasionar a LA UNIVERSIDAD o a terceros, por el incumplimiento de lo declarado o que pudiera encontrar causas en la tesis presentada, asumiendo todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para LA UNIVERSIDAD en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de lo declarado o las que encontraren causa en el contenido del trabajo de investigación. De identificarse fraude, piratería, plagio, falsificación o que el trabajo haya sido publicado anteriormente; asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan.	





6. Datos del Documento Digital a Publicar: (Ingrese todos los datos requeridos completos)

Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la Información en el Acta de Sustentación)			2023					
Modalidad de obtención del Grado Académico o Título Profesional: (Marque con X según Ley Universitaria con la que inició sus estudios)	Tesis	<input checked="" type="checkbox"/>	Tesis Formato Artículo	<input type="checkbox"/>	Tesis Formato Patente de Invención	<input type="checkbox"/>		
	Trabajo de Investigación	<input type="checkbox"/>	Trabajo de Suficiencia Profesional	<input type="checkbox"/>	Tesis Formato Libro, revisado por Pares Externos	<input type="checkbox"/>		
	Trabajo Académico	<input type="checkbox"/>	Otros (especifique modalidad)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Palabras Clave: (solo se requieren 3 palabras)	PUÉRPERAS	<input type="checkbox"/>	RECHAZO	<input type="checkbox"/>	MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	<input type="checkbox"/>		
Tipo de Acceso: (Marque con X según corresponda)	Acceso Abierto	<input checked="" type="checkbox"/>	Condición Cerrada (*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Con Periodo de Embargo (*)	<input type="checkbox"/>	Fecha de Fin de Embargo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una "X" en el recuadro del costado según corresponda):					SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
Información de la Agencia Patrocinadora:					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

El trabajo de investigación en digital y físico tienen los mismos registros del presente documento como son: Denominación del programa Académico, Denominación del Grado Académico o Título profesional, Nombres y Apellidos del autor, Asesor y Jurado calificador tal y como figura en el Documento de Identidad, Título completo del Trabajo de Investigación y Modalidad de Obtención del Grado Académico o Título Profesional según la Ley Universitaria con la que se inició los estudios.

7. Autorización de Publicación Digital:

A través de la presente. Autorizo de manera gratuita a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán a publicar la versión electrónica de este Trabajo de Investigación en su Biblioteca Virtual, Portal Web, Repositorio Institucional y Base de Datos académica, por plazo indefinido, consintiendo que con dicha autorización cualquier tercero podrá acceder a dichas páginas de manera gratuita pudiendo revisarla, imprimirla o grabarla siempre y cuando se respete la autoría y sea citada correctamente. Se autoriza cambiar el contenido de forma, más no de fondo, para propósitos de estandarización de formatos, como también establecer los metadatos correspondientes.

Firma: 		
Apellidos y Nombres:	CALDERON ALIAGA YADIRA BENITA	Huella Digital
DNI:	73588917	
Firma: 		
Apellidos y Nombres:	TIMOTEO CORI LAURA THALIA	Huella Digital
DNI:	73637673	
Firma:		
Apellidos y Nombres:		Huella Digital
DNI:		
Fecha: 31/08/2023		

Nota:

- ✓ No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento.
- ✓ Marque con una X en el recuadro que corresponde.
- ✓ Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra **calibri**, **tamaño de fuente 09**, manteniendo la alineación del texto que observa en el modelo, sin errores gramaticales (*recuerde las mayúsculas también se tildan si corresponde*).
- ✓ La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que presente, tales como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada.
- ✓ Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda.