

**UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"**  
**HUANUCO**  
**FACULTAD DE ENFERMERÍA**



---

---

**FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LACTANCIA  
MATERNA EN MUJERES QUE TUVIERON PARTO  
EUTÓCICO O CESAREA EN EL PERIODO DE  
FEBRERO A JULIO DEL 2011 EN EL DISTRITO  
DE PILLCO MARCA**

---

---

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**TESISTAS:**

**Bach.Enf. APOLIN FIGUEROA, Ludgarda**  
**Bach.Enf. FERRER TELLO, Guisella Movak**  
**Bach.Enf. PALERMO DIAZ, Kelly Vaneza**

**ASESORA: JOVITA SOTO HILARIO**

**HUÁNUCO-PERÚ**  
**2011**

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar la relación entre la lactancia materna y los factores maternos y del lactante en mujeres que tuvieron parto eutócico o cesárea en el periodo de febrero a julio del 2011. **Material y método:** Se aplicó un estudio de tipo descriptivo correlacional, transvesal, retrospectivo. Se consideró una población muestral, conformada por las madres que tuvieron parto eutócico o cesárea en el periodo de febrero a julio del 2011 del distrito de Pilcomarca. Se empleó la encuesta, con el que se recopiló información sobre: la práctica de lactancia materna, los factores maternos y del lactante; para la contrastación de las hipótesis estadísticas se utilizó un análisis bivariado mediante el Chi Cuadrado de Pearson. **Resultados:** El 79,5% (66) de mujeres brindaron LME durante los 6 meses; frente al 20.5% (17) no lo hicieron. Respecto a los factores maternos: no fue significativa la relación entre la lactancia materna y las etapas de vida de la madre ( $X^2 = 2.63$  y  $p=0.26$ ); fue significativa: la relación entre la lactancia materna y el estado civil ( $X^2 = 11.96$   $p=0.008$ ), el nivel educativo ( $X^2 = 21,185$   $p=0.002$ ), el IMC ( $X^2 = 34,252$   $p=0.000$ ) y el control post parto ( $X^2 = 8,80$   $p=0.003$ ), y fue altamente significativa la relación entre la lactancia materna y la ocupación ( $X^2 = 28,093$   $p=0.000$ ), el conocimiento sobre lactancia materna ( $X^2 = 83.00$   $p=0.000$ ), los problemas en los pechos ( $X^2 = 36.541$   $p=0.000$ ), y el control prenatal ( $X^2 = 21,25$   $p=0.000$ ). En relación a los factores del lactante: no fue significativa: la relación entre la lactancia materna y el peso del RN ( $X^2 = 5,206$  y  $p=0.074$ ); pero fue altamente significativa: la relación entre la lactancia materna y la frecuencia de enfermedad del lactante ( $X^2 = 74,472$   $p=0.000$ ) y el tipo de enfermedad que afectó al lactante ( $X^2 = 41,636$   $p=0.000$ ). **Conclusión:** La lactancia materna y los factores maternos y del lactante se relacionan y por tanto se rechaza la hipótesis nula.

**Palabras Claves:** *Lactancia materna exclusiva, Factores maternos, factores del lactante, parto eutócico, cesárea.*