


UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"
HUANUCO
FACULTAD DE OBSTETRICIA



**"EFICACIA DE LA SANGRE DE GRADO (*CROTON
LECHLERI*) EN EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN
Y RECUPERACIÓN POST EPISIORRAFIA, HOSPITAL
CESAR GARAYAR GARCIA, IQUITOS - 2012"**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
O B S T E T R A

**TESISTAS: HERRERA ESTEBAN, YIMI RONALD
HUAMAN PASCUAL, OLIBER FERMIN
RETIS PALOMINO, ELMER**

ASESORA: DRA.: MONICA TAMAYO GARCIA

HUÁNUCO-PERÚ
2013

RESUMEN

Se realizó un estudio experimental, correlacional, prospectivo de tipo longitudinal, este estudio se llevó a cabo entre los meses de abril a diciembre del 2012 en el Hospital Iquitos Cesar Garayar García, ubicado en la ciudad de Iquitos, capital de la región de Loreto y de la provincia de Maynas, el estudio tuvo la finalidad de determinar la eficacia de la Sangre de Grado en el proceso de cicatrización y la recuperación post Episiorrafia en púerperas atendidas en el mencionado nosocomio. El estudio fue de tipo experimental, teniendo como marco muestral a 50 pacientes púerperas, divididos en dos grupos de estudio, cada uno 25 púerperas (grupo experimental y grupo control).

El tratamiento psicoprofiláctico de la episiorrafia mediante la aplicación de la Sangre de Grado demostró ser efectivo en relación a los días de cicatrización, en la cual observamos en el grupo experimental que el 68% de mujeres (17), la cicatrización de la Episiorrafia se dio en menos de 12 días; el 32% (8) se dio entre 12 y 21 días. En el grupo control el 92% de mujeres (23), la cicatrización de la Episiorrafia estuvo dada entre 12 a 21 días y el 4% (1) en menos de 12 días la cicatrización y en más de 21 días respectivamente.

Los resultados de la comprobación de la hipótesis, nos permite afirmar que existe correlación entre el uso de la Sangre de Grado y los días de cicatrización. Por lo tanto podemos concluir que la aplicación de la Sangre de Grado en el tratamiento psicoprofiláctico en el proceso de cicatrización y recuperación post episiorrafia demostró ser efectivo en relación al grupo control que recibió el tratamiento habitual determinando así que la hipótesis de investigación es aceptada en el presente estudio.

PALABRAS CLAVES: *Sangre de Grado, tratamiento psicoprofiláctico, post episiorrafia, eficacia.*