

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"



ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

"CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLOGICAS DE PREECLAMPSIA SEVERA EN GESTANTES ADMITIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL "HERMILIO VALDIZAN MEDRANO – HUÁNUCO – 2012"

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

TESISTAS:

- **AQUINO GONZALES, Adolfo**
- **RAMOS GARAY, Nohely Yunia**

ASESOR: DRA. MIRAVAL TARAZONA, ZOILA

HUÁNUCO – PERÚ

2013

RESUMEN

La preeclampsia severa es una complicación de la gestación y es causa importante de morbilidad materna, fetal y neonatal en el mundo, los intentos para conseguir su prevención están justificados.

El presente estudio se realiza con la finalidad de "Determinar las características de la preeclampsia severa en gestantes admitidas en el Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano – Huánuco". Se trabajó con una muestra de 18 gestantes. Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta el método de tipo descriptivo, retro prospectivo y analítico. El diseño pertenece al no experimental de tipo transversal. Para el estudio se obtuvo una muestra de 18 mujeres embarazadas con preeclampsia severa, lo cual fueron seleccionadas de un total de 1033 pacientes admitidas. Los criterios de inclusión fueron las gestantes de cualquier edad con más de 22 semanas de gestación que presentan preeclampsia severa en el periodo de estudio, se consideró las gestantes que eran nulípara o que tenían 1 a más partos. El material y método utilizado fueron las diversas teorías relacionados con el tema en estudio, se aplicó el análisis documental y la recopilación de datos de las Historia Clínicas de cada gestante con preeclampsia severa referente a semana de gestación, paridad, tipo de parto anterior, IMC, tipo de alimentación, grado de instrucción, edad, estado civil, ocupación, estatus social, residencia y complicación.

Los principales resultados fueron lo siguiente: un 55.6% tenían entre 31-35 semanas de gestación, el 50% con una paridad de 1-2, el 58.3% con un parto anterior de tipo vaginal, el 55.6% con un IMC de sobrepeso, el 50% con alimentación Hipercalórica, el 27.8% con secundaria completa y edad entre 20-24 años, el 66.7% son convivientes y amas de casa, el 83.3 con un estatus social media, el 50 % procedentes de zona urbana, el 31.6% presentaron presión elevada acompañada de proteinuria, el 8% hicieron cuadro de preeclampsia de las cuales el 22% tenían preeclampsia severa y de ellos el 94.4% culminaron su embarazo por cesárea y un 5.6% termino en parto eutócico. La contrastación y prueba de hipótesis a través de la significancia del Chi-Cuadrado, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna

que interpreta: "Las características epidemiológicas influyen medianamente en la preeclampsia severa de las gestantes admitidas". Del cual podemos concluir que las características de la preeclampsia severa pueden estar relacionadas con esta enfermedad, por lo que las gestantes deben recibir una atención prenatal adecuada, disminuyendo así la morbilidad materno perinatal.