



UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"



FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

**"CARACTERÍSTICAS DEL ABORTO Y USO INADECUADO
DEL MISOPROSTOL EN DOS HOSPITALES DE
HUÁNUCO - 2009"**



**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
MÉDICO CIRUJANO**

TESISTAS:

- Denny Pilar Pacheco Avila
- Javier Ortiz Camacho

HUÁNUCO – PERÚ

2011

**“CARACTERÍSTICAS DEL ABORTO Y USO INADECUADO DEL
MISOPROSTOL EN DOS HOSPITALES DE HUÁNUCO 2009”**

RESUMEN

OBJETIVO: Explorar las características sociodemográficas, clínicas, antecedentes obstétricos del aborto y uso inadecuado del misoprostol en las mujeres con diagnóstico de aborto en dos establecimientos de salud de Huánuco, Julio– Setiembre 2009.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo, observacional de corte transversal de 117 mujeres con diagnóstico de aborto ingresadas al Hospital Regional Hermilio Valdizán y Hospital Base II - Es Salud Huánuco, durante el periodo comprendido entre 01 de Julio del 2009 y el 31 de Setiembre del 2009. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS.

RESULTADOS: De 117 pacientes entrevistadas 82,1 % ingresaron al HRHVM y 17.9 % al Hospital Base II – Es Salud Huánuco. El 20,5 % reconoció haber usado misoprostol. Entre las características sociodemográficas: 29,9% tuvieron edades de 20 a 24 años, 41,9% tuvieron estudios secundarios, más de la mitad fueron convivientes (51,3%), el 47% eran amas de casa. Con respecto a los antecedentes obstétricos se encontró que: el 39,3% eran multíparas, casi todas tuvieron < 3 abortos

anteriores y el 59,8 % acudieron con una gestación < a 12 semanas. El aborto incompleto se presentó en 80,3 % de casos. El sangrado fue el motivo principal de atención (77,8%). De las pacientes que reconocieron haber usado misoprostol, emplearon 1 ó 2 tabletas, el dispensador de la farmacia fue el proveedor más frecuentemente referido y la vías oral y oral-vaginal fueron los más empleados. El uso de misoprostol se relacionó con edad (RP = 7,98; p = 0,001; IC = 95%) y paridad (RP = 5,37; p = 0,001; IC = 95%).

CONCLUSIONES: En nuestro medio se está usando inadecuadamente el misoprostol y sin prescripción médica, ya que es consumido entre 1 y 2 tabletas empleando preferentemente la vía oral y oro-vaginal, siendo el vendedor de la farmacia el principal proveedor de este fármaco. El aborto incompleto se presentó con mayor frecuencia. El uso inadecuado de Misoprostol se encontró relacionado a ser Nulípara y tener menos de 25 años. El grado de instrucción, lugar de procedencia, estado civil, ocupación, tipo de aborto, edad gestacional y antecedente de aborto no presentaron diferencias importantes entre las que usaron vs las que no usaron el misoprostol.

PALABRAS CLAVE: Aborto, antecedentes obstétricos, características sociodemográficas, características clínicas, misoprostol.