



**UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN”**

**FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**

**E.A.P. MEDICINA HUMANA**

---

**“FACTORES ASOCIADOS A PREECLAMPSIA EN EL HOSPITAL  
ESSALUD II - HUÁNUCO DURANTE EL PERIODO 2008 - 2010”**

---

**TESISTAS:**

**GARAY HUERTO, JUAN CARLOS**

**NEGRILLO JERÍ, JESSICA MARISABELL**

**VARGAS ROMERO, ISABEL YANINA**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE MEDICO CIRUJANO**

**HUANUCO – PERU**

**2013**

## RESUMEN

*Objetivo:* determinar la asociación de preeclampsia con la edad materna, la historia previa de preeclampsia y la nuliparidad en el Hospital ESSALUD II – Huánuco durante el periodo 2008 – 2010.

*Material y método:* Se ha realizado un estudio observacional, analítico, transversal, retrospectivo, de casos y controles; desde Enero del 2008 hasta Diciembre del 2010. La muestra consistió en 90 casos y 90 controles seleccionados aleatoriamente de las historias clínicas de los registros del Hospital ESSALUD II – Huánuco, cuyos datos fueron obtenidos a través de una ficha de recolección de datos. Se analizó la asociación de preeclampsia con la edad materna, la historia previa de preeclampsia y la nuliparidad, utilizando análisis bivariado.

*Resultados:* la edad materna mayor o igual a 35 años estuvo significativamente asociada al desarrollo de preeclampsia (OR=6,33 IC95% 3,20 - 12,53), asimismo la nuliparidad fue un factor asociado (OR=7,75 IC 95%: 3,77 - 15,92). No se encontró asociación entre la historia previa de preeclampsia y el diagnóstico de preeclampsia (OR=1,81 IC95%: 0,95 - 3,48).

*Conclusiones:* Los factores de riesgo edad materna mayor a 35 años y la nuliparidad se asociaron significativamente a preeclampsia, no así la historia previa de preeclampsia.

*Palabras clave:* Preeclampsia, nuliparidad, edad, Huánuco.