



**Universidad Nacional
“Hermilio Valdizán”**

**Facultad de Medicina
E.A.P. de Medicina Humana**

**FACTORES RELACIONADOS A PARTOS POR
CESÁREA EN EL HOSPITAL II ES-SALUD DE
HUÁNUCO EN EL PERÍODO DEL 2009-2010**

Tesista

**HUAMÁN SANTILLÁN, Nike Abner
PALACIOS SÁNCHEZ, Carla
ROJAS ESPINOZA, María Angélica**

**Tesis para Optar el Título Profesional de
Médico Cirujano**

**Huánuco – Perú
2013**

“FACTORES RELACIONADOS A PARTOS POR CESÁREA EN EL HOSPITAL II ES-SALUD DE HUÁNUCO EN EL PERÍODO DEL 2009-2010”

RESUMEN

OBJETIVO:

Determinar la frecuencia de las cesáreas en el Hospital II EsSalud - Huánuco e identificar los factores relacionados a cesárea.

MÉTODO:

Estudio transversal realizado en el departamento de Huánuco durante el 2009 - 2010. La variable dependiente fue el tipo de parto y las variables independientes fueron características clínicas y no clínicas. Para la obtención de los datos se utilizaron las historias clínicas. Se realizó un análisis bivariado de las variables clínicas, usando X^2 y la prueba exacta de Fisher, se asoció con razón de prevalencia (RP); el análisis estadístico de la variable no clínica se realizó con la correlación de Pearson.

RESULTADOS:

La tasa de cesárea obtenida fue de 37,16%, encontrándose asociación entre cesárea y las variables cesárea previa [p=0,000; RP: 2,81 (IC: 2,12-3,72)], presentación no cefálica [p=0,034; RP: 2,14 (IC: 1,37-3,34)], desprendimiento prematuro de placenta [p=0,039; RP: 2,61 (IC: 1,73-3,94)], sufrimiento fetal agudo [p=0,000; RP: 2,68; (IC: 1,99-3,60)], ruptura prematura de membrana [p=0,011; RP: 1,76 (IC: 1,20-2,58)], placenta previa (p=0,013; RP: 2,71 (IC: 1,92-3,82)) y disturbio de líquido amniótico (p=0,012; RP: 1,90 (IC: 1,26-2,88)); no siendo estadísticamente significativas las variables macrosomía fetal, hipertensión

inducida por el embarazo, tratamiento por infertilidad, embarazo múltiple y condilomatosis.

La variable no clínica, médico no fue significativo.

CONCLUSIONES:

La tasa de cesárea en el Hospital II EsSalud- Huánuco fue de 37,16%; los factores relacionados a cesárea fueron cesárea previa, presentación no cefálica, desprendimiento prematuro de placenta, sufrimiento fetal agudo, ruptura prematura de membrana, placenta previa y disturbio de líquido amniótico.

Palabras Claves: Cesárea, ruptura prematura de membrana, placenta previa, Huánuco.